

## Strepsils, pastylki do ssania, miód-cytryna, 24 sztuk



Cena: 26,99 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	Reckitt Benckiser Poland S.A.
Substancja czynna	Amylmethacresolum, 2,4-Dichlorbenzylalcoholum
Typ produktu	

### Opis produktu

## Lek bez recepty

## Strepsils z miodem i cytryną, pastylki twarde - 24 sztuki

(Amylmethacresolum, 2,4-Dichlorbenzylalcoholum)

### Opis produktu:

Lek Strepsils z miodem i cytryną przeznaczony jest do stosowania w objawowym leczeniu stanów zapalnych jamy ustnej oraz gardła.

### Skład:

**Substancje czynne:** 1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego oraz 0,6 mg amylometakrezolu

**Substancje pomocnicze** - miód, kwas winowy, żółcień chinolinową (E 104), olejek miętowy, olejek cytrynowy, syrop z glukozy, syrop z sacharozy.

1 pastylka zawiera: 1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego oraz 0,6 mg amylometakrezolu, miód, kwas winowy, żółcień chinolinową (E 104), olejek miętowy, olejek cytrynowy, syrop z glukozy, syrop z sacharozy.

### Wskazania:

- Leczenie stanów zapalnych jamy ustnej i gardła.

## Działanie:

Lek Strepsils z miodem i cytryną jest przeznaczony do stosowania w objawowym leczeniu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła. Podanie na błonę śluzową jamy ustnej.

Lek Strepsils z miodem i cytryną zawiera:

- dwie substancje czynne o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwwirusowym,
- naturalny miód jako substancję pomocniczą.

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Dorośli oraz dzieci w wieku powyżej 6 lat: ssać powoli jedną pastylkę co 2-3 godziny.

Nie należy stosować więcej niż 8 pastylek na dobę.

Jeśli dolegliwości nie ustępują lub nasilają się, należy zasięgnąć porady lekarza.

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku.

Nie należy stosować leku **Strepsils z miodem i cytryną**:

- Jeśli występuje nadwrażliwość na składniki preparatu.
- U osób z cukrzycą lub nietolerancją cukrów przed zastosowaniem należy poradzić się lekarza.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Mogą wystąpić reakcje alergiczne i bolesność języka.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku **Strepsils** należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

Jeśli u pacjenta występuje:

- cukrzyca
- nietolerancja niektórych cukrów

Jeśli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję cukrów, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

**Ciąża i karmienie piersią:**

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

#### Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Nie należy stosować w wieku poniżej 6 lat.

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

- Dotychczas nie są znane kliniczne istotne leku Strepsils z miodem i cytryną z innymi lekami.

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

## Podmiot odpowiedzialny:

RECKITT BENCKISER POLAND SA, Wołoska 22, Warszawa

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.