

Sudafed, XyloSpray, 0,1%, aerozol, zatkały nos, katar alergiczny,



Cena: 27,63 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	McNeil
Substancja czynna	Xylometazolinum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Sudafed XyloSpray, 1 mg/ml, aerozol do nosa - 10 ml

(Xylometazolini hydrochloridum)

Opis produktu:

Sudafed XyloSpray to produkt leczniczy, którego substancja czynna - ksylometazolina zmniejsza obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa. Lek ten może być stosowany w zapaleniu błony śluzowej nosa, alergicznym zapaleniu błony śluzowej, jak również w stanach zapalnych zatok przynosowych.

Skład:

- **Substancją czynną jest:** ksylometazolina (Xylometazolini hydrochloridum).
- **Substancje pomocnicze:** chlorek benzalkoniowy roztwór, disodu edetynian, sodu chlorek, sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwuwodny, sorbitol ciekły 70% (niekryształizujący), woda oczyszczona.

1 ml roztworu zawiera 1 mg chlorowodoru ksylometazoliny.

Wskazania:

Wskazaniami do zastosowania **Sudafed XyloSpray** są:

- ostry stan zapalny błony śluzowej, naczynioruchowe zapalenie błony śluzowej,
- alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa,
- zapalenie zatok przynosowych (leczenie wspomagające),
- zapalenie trąbki słuchowej ucha środkowego (leczenie wspomagające).

Działanie:

- **Sudafed XyloSpray** zawiera ksylometazolinę, która obkurcza naczynia krwionośne, czego efektem jest zmniejszenie się obrzęku błony śluzowej nosa i jej przekrwienia.
- Zmniejszający się obrzęk wiąże się z ułatwionym oddychaniem oraz ułatwia odpływ zalegającej wydzieliny.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek do podawania donosowego.
- Leku nie należy stosować dłużej niż 7 dni.
- Ponowne stosowanie leku można rozpocząć po kilkudniowej przerwie.
- 1 aerozol powinien być stosowany przez 1 osobę, ze względów higienicznych.
- Przed pierwszym zastosowaniem naciskać pompkę, aż do pojawienia się jednorodnej mgiełki rozpylonego leku.

Dorośli i dzieci od 6 roku życia: 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego do 3 razy na dobę. Nie stosować więcej niż 3 dawek do każdego otworu nosowego.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

Nie należy stosować leku:

- w przypadku pacjentów po operacji usunięcia przysadki lub po innych zabiegach związanych z odsłonięciem opony twardej.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób):

- podrażnienie błony śluzowej (pieczenie, suchość),
- kichanie.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób):

- kołatanie serca, przyspieszenie czynności serca, podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):

- nudności,
- zaburzenia widzenia,
- reakcje alergiczne,
- ból głowy, bezsenność, zmęczenie.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Długotrwałe lub częste stosowanie może wiązać się z wystąpieniem przekrwienia reaktywnego - wtórnego obrzęku błony śluzowej nosa. Nadużywanie tego leku może również prowadzić do suchego zanikowego zapalenia błony śluzowej nosa.
- Lek zawiera chlorek benzalkoniowy, które może powodować przekrwienie błony śluzowej nosa.
- Stosowanie leku omówić z lekarzem, jeśli u pacjenta występuje: podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe (szczególnie jaskra z wąskim kątem przesączania), ciężkie choroby układu krążenia (nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca), zaburzenia metaboliczne (cukrzyca, nadczynność tarczycy), nadwrażliwość na substancje o podobnym działaniu.
- Stosowanie leku omówić z lekarzem, jeśli pacjent stosuje inhibitory MAO (leki stosowane w depresji) lub inne leki, które wpływają na wzrost ciśnienia tętniczego.
- **Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki wynosi 24 tygodnie.**

Ciąża, karmienie piersią:

-

W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

Nie należy stosować u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Okres ważności leku po pierwszym otwarciu butelki wynosi 24 tygodnie.

Podmiot odpowiedzialny:

McNeil, Dublin, Irlandia

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.