

# Sudafed, XyloSpray, HA, dla dzieci, katar, 10 ml



Cena: 24,32 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	McNeil
Substancja czynna	Xylometazolinum
Typ produktu	

## Opis produktu

## Lek bez recepty

### Sudafed XyloSpray HA dla dzieci, 0,5mg/ml, aerozol do nosa - 10 ml

(Xylometazolini hydrochloridum)

## Opis produktu:

Sudafed XyloSpray dla dzieci to lek zmniejszający obrzęk błony śluzowej i ułatwiający oddychanie.

## Skład:

- **Substancją czynną jest** ksylometazoliny chlorowodorek (Xylometazolini hydrochloridum).
- **Substancje pomocnicze:** disodu edetynian, sodu chlorek, sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwuwodny, sorbitol ciekły, niekryształizujący, benzalkoniowy chlorek, roztwór, woda oczyszczona.

1 ml roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodoru.

1 dawka (70 µl) zawiera 35 µg ksylometazoliny chlorowodoru.

## Wskazania:

- Sudafed XyloSpray dla dzieci stosuje się do **krótkotrwałego i objawowego leczenia przekrwienia błony śluzowej nosa w przebiegu zapalenia błony śluzowej nosa lub zapalenia zatok.**

## Działanie:

- Substancja czynna leku **Sudafed XyloSpray dla dzieci**, podana na błonę śluzową nosa, **powoduje zwężenie zawartych w niej naczyń krwionośnych.** Dzięki temu zmniejsza się obrzęk nosa, ilość powstającej wydzieliny, a oddychanie staje się łatwiejsze. **Zbyt długie stosowanie może wywołać efekt odwrotny.**

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zwykle stosowana dawka u **dzieci w wieku 2 do 12 lat:**

Jedna dawka do każdego otworu nosowego, nie częściej niż 3 razy na dobę.

- Przed pierwszym użyciem należy kilka razy nacisnąć pompkę, aż do pojawienia się mgiełki.
- Aplikator należy opłukać po użyciu i nie powinien być stosowany przez więcej niż jedną osobę.
- Jeśli po 3 dniach stan pacjenta się pogarsza, należy rozważyć stosowanie innych metod leczenia.
- **Nie stosować dłużej niż 7 dni.**

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

Nie należy stosować leku:

- u pacjentów z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, zwłaszcza u u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania;
- u pacjentów z suchym zapaleniem błony śluzowej nosa (Rhinitis sicca);
- u pacjentów po usunięciu przysadki i po innych zabiegach chirurgicznych wykonywanych drogą przynosową lub przez jamę ustną, przebiegających z odsłonięciem opony twardej;
- u pacjentów, którzy przyjmują lub przyjmowali przez ostatnie dwa tygodnie leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (inhibitory MAO) oraz tych, którzy przyjmują inne leki mogące zwiększać ciśnienie krwi;
- u pacjentów z zanikowym lub naczynioruchowym zapaleniem błony śluzowej nosa

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać stosowanie leku i natychmiast zwrócić się do lekarza, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów niepożądanych, które mogą być objawami reakcji alergicznej:

- trudności w oddychaniu lub przełykaniu, obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła;
- świąd z czerwoną wysypką lub pęcherzami.

**Często występujące działania niepożądane** (nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

- uczucie kłucia lub pieczenia w nosie i gardle oraz suchość błony śluzowej nosa

**Rzadko występujące działania niepożądane** (nie częściej niż u 1 na 1000 osób):

- ból głowy, wzrost ciśnienia, nerwowość, nudności, zawroty głowy, bezsenność i kołatanie serca
- przejściowe zaburzenia widzenia i ogólnoustrojowe reakcje alergiczne

**Częstotliwość nieznana** (częstotliwość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- nasilenie objawów zapalenia zatok lub błony śluzowej nosa po zaprzestaniu stosowania le

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

**Sudafed XyloSpray dla dzieci** może wchodzić w interakcję z

- niektórymi lekami przeciwdepresyjnymi, takimi jak trój- i czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne, inhibitory monoaminooksydazy oraz w ciągu dwóch tygodni od zastosowania inhibitorów monoaminooksydazy;
- innymi lekami, które podwyższają ciśnienie krwi.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Ciągłe stosowanie leku przez długi okres czasu może skutkować nasileniem zapalenia zatok lub śluzówki nosa.
- Lek zawiera chlorek benzalkoniowy który zwłaszcza przy dłuższym stosowaniu produktu leczniczego może powodować obrzęk błony śluzowej nosa.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C w oryginalnym opakowaniu.
- Po pierwszym otwarciu opakowania leku **Sudafed XyloSpray dla dzieci** nie należy **przechowywać dłużej niż przez 20 tygodni**.

**Ciąża, karmienie piersią:**

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

- Nie należy stosować leku **Sudafed XyloSpray dla dzieci** w trakcie ciąży ze względu na brak danych na temat jego działania na płód.
- Pacjentki karmiące piersią przed zastosowaniem leku powinny skonsultować się ze swoim lekarzem. Nie wiadomo, czy

substancja czynna tego leku przenika do mleka kobiecego.

#### Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat

#### Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Okres ważności leku po pierwszym otwarciu butelki wynosi 12 miesięcy.

#### Podmiot odpowiedzialny:

McNeil, Dublin, Irlandia

#### Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.