

# Sudafed, XyloSpray, HA, zatkany nos, katar, katar alergiczny, 10ml



Cena: 29,30 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	McNeil
Substancja czynna	Xylometazolinum
Typ produktu	

## Opis produktu

## Lek bez recepty

### Sudafed XyloSpray HA, 1 mg/g, aerozol do nosa - 10 ml

#### Opis produktu:

Sudafed XyloSpray HA jest lekiem obkurczającym naczynia krwionośne przez co zmniejsza obrzęk błony śluzowej nosa. Zawiera kwas hialuronowy, który nawilża błonę śluzową nosa.

#### Skład:

- Substancją czynną leku jest ksylometazolinu chlorowodorek.
- **Substancje pomocnicze:** sodu hialuronian, sorbitol, glicerol, sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwuwodny, sodu chlorek, woda do wstrzykiwań.

1 ml roztworu Sudafed XyloSpray HA zawiera 1 mg ksylometazolinu chlorowodoru

## Wskazania:

Wskazaniami do zastosowania **Sudafed XyloSpray HA** są:

- zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa w ostrym zapaleniu błony śluzowej, w naczynioruchowym zapaleniu błony śluzowej oraz w alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa,
- ułatwienie odpływu wydzieliny w zapaleniu zatok przynosowych oraz w zapaleniu trąbki słuchowej ucha środkowego połączonego z przeziębieniem.

## Działanie:

- Ksylometazolina jest lekiem obkurczającym naczynia krwionośne, przez co zmniejsza obrzęk błony śluzowej nosa.
- Początek działania leku występuje zwykle w ciągu 5-10 minut po podaniu.
- Zmniejszenie obrzęku błony śluzowej ułatwia oddychanie przez nos oraz ułatwia odpływ wydzieliny.
- Lek **Sudafed XyloSpray HA** zawiera jako substancję pomocniczą kwas hialuronowy w postaci soli sodowej, który chroni i nawilża błonę śluzową nosa.

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

**Dorośli i dzieci w w wieku powyżej 6 lat:** stosuje się jedną dawkę do każdego otworu nosowego 3 razy na dobę.

Leku nie należy stosować dłużej niż przez 5 dni.

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

Nie należy stosować leku:

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na ksylometazolinę chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników leku,
- jeśli u pacjenta występuje suche zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa,
- u pacjentów po usunięciu przesadki i po innych chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Często występuje nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów
- Niezbyt często występuje nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów
- Rzadko występuje nie częściej niż u 1 na 1 000 pacjentów

**Często** mogą występować objawy podrażnienia (pieczenie lub suchość błony śluzowej nosa), kichanie, zwłaszcza u pacjentów wrażliwych.

**Niezbyt często** występujące działania niepożądane to: możliwe wystąpienie ogólnoustrojowego działania leku, jak np. kołatanie serca, przyspieszenie czynności serca, podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi.

**Rzadko** mogą wystąpić nudności, zaburzenia widzenia, reakcje alergiczne, ból głowy, bezsenność lub uczucie zmęczenia.

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Lek nie zawiera środków konserwujących.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki wynosi 12 miesięcy.

### Ciąża, karmienie piersią:

- 

Lek nie powinien być stosowany przez pacjentki w ciąży. Pacjentki karmiące piersią, przed zastosowaniem leku powinny skonsultować się z lekarzem.

### Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

Nie należy stosować u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 6 lat.

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Okres ważności leku po pierwszym otwarciu butelki wynosi 12 miesięcy.

## Podmiot odpowiedzialny:

McNeil, Dublin, Irlandia

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie

stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.