

Supremin Max, syrop przeciwkaszlowy 1,5mg/ml 150 ml



Cena: 35,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Teva
Substancja czynna	Butamiratum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Supremin Max lek o działaniu przeciwkaszlowym 1,5 mg/ml - 150ml

(Butamirati citras)

Opis produktu:

Supremin MAX to produkt leczniczy do stosowania w przypadku kaszlu suchego (nieproduktywnego) o działaniu przeciwkaszlowym

Skład:

Substancją czynną jest:

- butamirat (Butamirati citras)

1 ml syropu zawiera 1,5 mg butamiratu cytrynianu

Substancje pomocnicze:

sodu benzoesan (E 211), sorbitol ciekły, niekrystalizujący (E 420), glicerol, sacharyna sodowa (E 954), aromat pomarańczowy płynny, kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, woda oczyszczona.

Wskazania:

- leczenie objawowe ostrego i nieproduktywnego (suchego) kaszlu

Działanie:

- Supremin MAX** zawiera **butamirat** - substancję czynną o działaniu przeciwkaszlowym (działającą ośrodkowo), należąca do nieopiodowych leków przeciwkaszlowych

- Supremin** łagodnie rozszerza oskrzela ułatwiając oddychanie, łagodzi kaszel dorosłych i dzieci

Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

- Dzieci w wieku od 3 do 6 lat:** 5 ml syropu trzy razy na dobę
- Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:** 10 ml syropu trzy razy na dobę
- Młodzież w wieku powyżej 12 lat:** 15 ml syropu trzy razy na dobę
- Dorośli:** 15 ml syropu cztery razy na dobę
- Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki
- Lek należy stosować doustnie, nie dłużej niż 7 dni bez konsultacji z lekarzem
- Miarkę umożliwiającą odmierzenie odpowiedniej ilości syropu, należy umyć i wysuszyć po każdorazowym użyciu

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

Leku Supremin MAX nie należy stosować:

- jeśli pacjent ma uczulenie na butamiratu cytrynian lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- jeśli pacjent ma objawy ciężkiego zahamowania czynności ośrodka oddechowego
- w pierwszym trymestrze ciąży
- u dzieci w wieku poniżej 3 lat

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Rzadko (częściej niż u 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów) występują następujące objawy:

- senność
- zawroty głowy
- nudności
- biegunka
- pokrzywka

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty

- należy unikać jednoczesnego podawania leków wykrztuśnych, ponieważ może to prowadzić do zalegania wydzieliny w drogach oddechowych, co zwiększa ryzyko skurczu oskrzeli i zakażenia dróg oddechowych

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- przed rozpoczęciem stosowania Supremin MAX należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. **Leku nie należy stosować dłużej niż 7 dni bez konsultacji z lekarzem**
- ze względu na hamowanie odruchu kaszlu przez butamiratu cytrynian, należy unikać jednoczesnego podawania leków wykrztuśnych
- w przypadku zastosowania większej dawki leku niż zalecana mogą wystąpić następujące objawy: **senność, nudności, wymioty, biegunka, zawroty głowy i obniżenie ciśnienia tętniczego**. W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza
- **lek zawiera sorbitol** - stosowanie tego leku omówić z lekarzem w przypadku stwierdzonej nietolerancji niektórych cukrów.
- Ze względu na zawartość sorbitolu, lek może mieć łagodne działanie przeczyszczające.

Ciąża i karmienie piersią:

-

jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku

-

lek Supremin MAX jest przeciwwskazany w pierwszym trymestrze ciąży

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- leku Supremin MAX nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

- lek Supremin MAX może powodować zawroty głowy lub senność. W związku z tym należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwanie maszyn

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:

Teva Pharmaceuticals Polska

Emilii Plater 53 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.