

Sylimarol 70mg, wątroba, niestrawność, 30tabletek



Cena: 17,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Herbapol Poznań
Substancja czynna	Silybum marianum fructus extractum siccum
Typ produktu	Lek ziołowy

Opis produktu

Lek bez recepty

Sylimarol 70mg - 30 tabletek drażowanych

(Silybum mariani fructus extractum siccum)

Opis produktu:

Sylimarol jest lekiem stosowanym wspomagająco w stanach rekonwalescencji wątroby po toksyczno - metabolicznych uszkodzeniach wątroby spowodowanych m.in. czynnikami toksycznymi (np. alkohol, środki ochrony roślin) oraz w niestrawności, np. po spożyciu ciężkostrawnych pokarmów.

Skład:

- **Substancje czynne:** suchy wyciąg z łuski ostropestu plamistego (Silybi mariani fructus extractum siccum).
- **Substancje pomocnicze:** benzoesan sodu, glukoza, skrobia ziemniaczana, sacharoza, talk, magnezu stearynian, guma arabska, mieszanina wosku pszczelego białego i wosku Carnauba (Capol 1295).

1 drażetka zawiera 100 mg wyciągu suchego z łuski ostropestu plamistego, ekstrahent - metanol 90% co odpowiada 77 mg sylimaryny.

Wskazania:

- Lek Sylimarol stosowany jest wspomagająco w stanach rekonwalescencji po toksyczno-metabolicznych uszkodzeniach

wątroby spowodowanych m.in. czynnikami toksycznymi (np. alkohol, środki ochrony roślin)

- **Niestrawność (wzdęcia, odbijania)** po spożyciu ciężko strawnych pokarmów.
- Wspomagająco w dolegliwościach po **przebyciu ostrych i przewlekłych chorób wątroby**.

Działanie:

•

Sylimarol 70 mg zawiera flawonolignany, które wykazują działanie ochronne na komórki wątroby przez stabilizację i uszczelnienie błon komórkowych, co utrudnia przenikanie substancji toksycznych do wnętrza hepatocytów.

Dawkowanie:

- Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty
- Sylimarol stosuje się doustnie. Dorośli i dzieci powyżej 12 lat - 3 razy dziennie po 1 tabletkę po jedzeniu o ile lekarz nie zaleci inaczej. Lek wymaga systematycznego stosowania przez około 2 - 4 tygodnie. Jeśli dolegliwości nasiliły się lub nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem, który może przedłużyć leczenie do np. 6 miesięcy.
- Podczas terapii należy unikać środków szkodliwych dla wątroby.

Przeciwwskazania:

- Nie należy stosować leku jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników.
- Nie należy stosować jeśli pacjent ma uczulenie na substancje występujące w ostropestie lub rośliny z rodziny Asteraceae.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Sporadycznie obserwowane jest łagodne działanie przeczyszczające.
- Jeśli pojawią się jakiegokolwiek objawy niepożądane w tym objawy nie wymienione w ulotce natychmiast należy o tym powiedzieć lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- W przypadku wystąpienia objawów żółtaczki (zażółcenia skóry, zabarwienia na żółto oczu) należy zasięgnąć porady lekarza.
- Lek nie jest przeznaczony do leczenia ostrych zatruc wątroby.
- Podczas terapii należy unikać środków szkodliwych dla wątroby.
- Sylimarol zawiera 0,21 mg benzoesu sodu E211 w każdej tabletkę, co odpowiada 0,66 mg/g. Substancja ta może zwiększać ryzyko żółtaczki (zażółcenie skóry i białkówki oczu) u noworodków (do 4. tygodnia życia).

- Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w każdej tabletkie, to znaczy lek uznaje się za wolny od sodu.
- Drazetki Sylimarol 70 mg zawierają glukozę i sacharozę, dlatego w przypadku pacjentów z nietolerancją niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Stosowanie innych leków:

- Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach nawet tych, które wydawane są bez recepty.
- Dotychczas nie stwierdzono interakcji z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią:

- Nie wykonano kontrolowanych badań klinicznych u kobiet w ciąży i kobiet w okresie laktacji dlatego nie należy stosować preparatu w okresie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Sylimarol 70mg nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci+
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko
- Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze do 25°C

Podmiot odpowiedzialny:

Poznańskie Zakłady Zielarskie "Herbapol", Poznań, ul.Towarowa 47-51

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd,

poinformuj nas o tym