

Syrop Prawoślazowy, Althan, 125 g



Cena: 5,65 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE PROLAB SP. Z O.O.
Substancja czynna	Althaea officinalis
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Syrop Prawoślazowy, Althan, 125g

(Althaeae sirupus)

Skład:

Substancje czynne leku:

100 g syropu zawiera macerat z korzenia prawoślazu (*Althaeae radicis maceratio*), etanol 760 g/l

Substancje pomocnicze: sacharoza, kwas benzoesowy (E210)

Lek zawiera nie więcej niż 1,0% (v/v) etanolu.

Wskazania:

- Podrażnienie śluzówki jamy ustnej i gardła oraz związany z tym kaszel.
- Jeśli wystąpią duszności, gorączka lub ropna wydzielina podczas stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Działanie:

- Przeciwkaszlowe, osłaniające.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie: dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

- 4-5 razy na dobę po 2 łyżeczki (10 ml).

Dzieci w wieku powyżej 6 lat:

- 4-5 razy na dobę po 1 łyżeczce (5 ml). Dzieci w wieku od 3 do 6 lat: do 3 razy na dobę po 1 łyżeczce (5 ml).

Dzieci w wieku poniżej 3 lat:

- Nie zaleca się stosowania.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników.

- Jeżeli pacjent ma uczulenie na którykolwiek ze składników leku, w tym kwas benzoesowy.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Dotychczas nieznanne.
- W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych zaprzestać stosowania leku oraz poinformować o nich lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Lek zawiera 64 g sacharozy (5 ml syropu zawiera 4,2 g sacharozy). Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.
- Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
- Lek zawiera nie więcej niż 1,0% (v/v) alkoholu (etanolu), tzn. nie więcej niż 40 mg na dawkę (5 ml), co jest równoważne mniej niż 1 ml piwa lub 0,4 ml wina na dawkę. Mała ilość alkoholu w tym leku nie będzie powodowała zauważalnych skutków.
- Lek zawiera 6,6 mg kwasu benzoesowego (E210) w każdym 5 ml syropu, co odpowiada 1,32 mg/ml. Kwas benzoesowy (E210) może zwiększać ryzyko żółtaczk (zażółcenie skóry i białówek oczu) u noworodków (do 4. tygodnia życia).
- Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 3 lat. O stosowaniu u dzieci młodszych może zdecydować wyłącznie lekarz pediatra.

Ciąża i karmienie piersią:

- Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

- Lek w zalecanych dawkach nie wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Dzieci poniżej 3 lat:

- Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 3 lat

Interakcje z innymi lekami:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

- Nieznane.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25o C.
- Chronić od światła.
- Po pierwszym otwarciu okres przechowywania wynosi 30 dni.

Podmiot odpowiedzialny:

Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A., ul. Towarowa 47-51, 61-896 Poznań,

Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.