

Syrop tymiankowy złożony Amara 125 g



Cena: 6,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka ZAKŁ. FARMACEUTYCZNY AMARA SP. Z O.O.

Substancja czynna Thymus vulgaris

Typ produktu

Opis produktu

Lek wydawany bez recepty

Syrop tymiankowy złożony Amara, 15g+10g / 100g syrop, 125 g

(Thymi sirupus compositus)

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w określonych wskazaniach wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania

Wskazania:

- Syrop tymiankowy złożony wskazany jest do stosowania w kaszlu towarzyszącym nieżytom górnych dróg oddechowych jako środek wykrztuśny

Działanie:

- Wykazuje działanie wykrztuśne.

Skład:

Substancje czynne:

- płynny ekstrakt z ziela tymianku (Thymi extractum fluidum)
- tymol (Thymolum).

100 g syropu zawiera:

- 15 g Thymi extractum fluidum (1:3) ekstrahent – mieszanina o składzie: amonowy wodorotlenek (96 g/l), glicerol (860 g/l), etanol (736 g/l), woda; 0,01 g Thymolum

Zawartość etanolu nie więcej niż 4,85% (m/m).

Substancje pomocnicze:

- wodorotlenek amonowy (96,0 g/l), etanol (760 g/l), syrop prosty

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież (powyżej 12 roku życia):

- 3 razy na dobę 10 ml (łyżka stołowa)

Stosowanie u dzieci i młodzieży:

- **Dzieci od 6-12 lat:** 3 razy na dobę 5 ml (łyżeczka od herbaty)

Sposób i droga podania:

- Podanie doustne u dorosłych i dzieci od 6 lat.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Syropu tymiankowego złożonego Amara:

- W razie przyjęcia dawki większej niż zalecana należy skonsultować się z lekarzem.

Pominięcie przyjęcia leku Syrop tymiankowy złożony Amara:

- Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki
- W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutom

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek ze składników produktu leczniczego.

Dzieci i młodzież:

- Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Podczas stosowania Syropu tymiankowego złożonego odnotowano reakcje nadwrażliwości oraz zaburzenia żołądkowe.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność:

- Jeśli pacjenta jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- Bezpieczeństwo stosowania podczas ciąży i laktacji nie zostało ustalone w związku z tym stosowanie podczas ciąży i laktacji nie jest zalecane.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn:

- W zalecanych dawkach nie stwierdzono istotnego wpływu

Etanol:

- Syrop tymiankowy złożony zawiera nie więcej niż 4,8 % (m/m) etanolu.
- Jednorazowa dawka leku (10 ml) zawiera ok.0,36 g etanolu, co jest równoważne 9 ml piwa i 3,75 ml wina.

- Nie stosować u osób z chorobą alkoholową.
- Należy uwzględnić zawartość etanolu u dzieci oraz pacjentów z chorobami wątroby i padaczką.

Sacharoza:

- Lek zawiera sacharozę, należy wziąć pod uwagę pacjentów z cukrzycą, jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku

Interakcje z innymi lekami:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

- Nie odnotowano interakcji.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- W oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.
- Chronić od światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
- Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Podmiot odpowiedzialny:

Zakład Farmaceutyczny Amara sp. z o.o.

ul. Stacyjna 5 30-851 Kraków

Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.