

## Syrop z babki lancetowatej 125 g



Cena: 12,99 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Substancja czynna	Plantago lanceolata
Typ produktu	Lek ziołowy

### Opis produktu

## Lek wydawany bez recepty

## Syrop z babki lancetowatej, 647mg / 5 ml syrop, 125 g

## (Plantaginis lanceolatae folii extractum fluidum)

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w określonych wskazaniach wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania

### Wskazania:

- Produkt tradycyjnie stosowany w nieżytach górnych dróg oddechowych i w przeziębieniu.
- Pomocniczo w zapaleniu gardła.

## Działanie:

- Wykrztuśne
- Łagodzące
- Pomocniczo przy przeziębieniu

## Skład:

### Substancje czynne:

- płynny wyciąg z liści babki lancetowatej (*Plantaginis lanceolatae folii extractum fluidum*)

### 100 g syropu zawiera:

- 10 g wyciągu płynnego (1:3) z *Plantago lanceolata* L., folium (liść babki lancetowatej), ekstrahent: etanol 60% (V/V)

Zawartość etanolu nie więcej niż 5,5% (m/m).

### Substancje pomocnicze:

- sacharoza, woda oczyszczona, aromat malinowy.

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

#### Dorośli i młodzież (powyżej 12 roku życia):

- 15 ml syropu od 3 do 4 razy na dobę.

#### Stosowanie u dzieci i młodzieży:

##### Dzieci od 6-12 lat:

- 5 ml syropu od 3 do 4 razy na dobę.

#### Sposób i droga podania:

- Podanie doustne.
- Do opakowania dołączona jest miarka.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach, należy zwrócić się do lekarza.

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek ze składników produktu leczniczego.

#### Dzieci i młodzież:

- Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Podczas stosowania syropu odnotowano przypadki osobniczej nadwrażliwości na składniki zawarte w babce lancetowatej.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

### Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- Ze względu na zawartość etanolu nie zaleca się stosowania leku u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią.

### Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

- Z uwagi na zawartość etanolu zastosowanie leku może ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

### Etanol:

- Syrop zawiera nie więcej niż 5,5% etanolu.
- 5 ml syropu zawiera etanol w ilości odpowiadającej około 3,8 ml wina o zawartości 12% alkoholu lub około 9,1 ml piwa o zawartości 5% alkoholu
- 15 ml syropu zawiera etanol w ilości odpowiadającej około 11,4 ml wina o zawartości 12% alkoholu lub około 27,3 ml piwa o zawartości 5% alkoholu
- Nie stosować u osób z chorobą alkoholową.
- Należy uwzględnić zawartość etanolu u dzieci oraz pacjentów z chorobami wątroby i padaczką

#### Sacharoza:

- Lek zawiera sacharozę, należy wziąć pod uwagę pacjentów z cukrzycą, jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku

## Interakcje z innymi lekami:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

- Nie są znane.

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- W oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.
- Chronić od światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
- Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

## Podmiot odpowiedzialny:

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A.

ul. Żmigrodzka 242e 51-131 Wrocław

## Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.