

## Tabex 1.5 mg, 100 tabletek



Cena: 56,99 PLN

### Opis słownikowy

Producent /  
Marka Sopharma

Substancja  
czynna Cytisinum

Typ produktu

### Opis produktu

## Lek wydawany bez recepty

### Tabex 1,5 mg - 100 tabletek powlekanych

### (Cytisinum)

Stosowanie produktu leczniczego Tabex pozwala na uzyskanie stopniowego zmniejszenia zależności organizmu od nikotyny i odzwyczajenie od palenia tytoniu bez objawów odstawienia nikotyny. Końcowym celem stosowania leku Tabex jest trwałe zaprzestanie używania produktów zawierających nikotynę.

### Wskazania:

Leczenie uzależnienia od nikotyny.

### Działanie:

Stopniowe zmniejszanie zapotrzebowania organizmu osoby palącej na nikotynę.

### Skład:

1 tabletką zawiera:

- **substancja czynna:** cytyzyna 1,5mg
- **substancje pomocnicze:** celuloza, proszek, wapnia siarczan dwuwodny, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, otoczka Opadry II brown 85G 265001 o składzie: alkohol poliwinylowy częściowo hydrolizowany, tytanu dwutlenek (E171),

makrogol 4000, lecytyna, talk, tlenek żelaza żółty (E172), tlenek żelaza czerwony (E172), tlenek żelazowy/tlenek żelaza czarny (E172).

## Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabex należy przyjmować doustnie z odpowiednią ilością wody zgodnie z następującym schematem:

- **od 1 do 3 dnia:** 1 tabletkę co 2 godziny, ( 6 tabletek na dobę)
- **od 4 do 12 dnia:** 1 tabletkę co 2,5 godziny, ( 5 tabletek na dobę)
- **od 13 do 16 dnia:** 1 tabletkę co 3 godziny, ( 4 tabletek na dobę)
- **od 17 do 20 dnia:** 1 tabletkę co 5 godzin, ( 3 tabletek na dobę)
- **od 21 do 25 dnia:** 1-2 tabletki na dobę.

Jedno opakowanie preparatu Tabex (100 tabletek) wystarcza na pełną terapię. Czas leczenia to 25 dni.

Osoba paląca powinna całkowicie zrezygnować z palenia, najpóźniej 5 dnia po rozpoczęciu leczenia. Osoba, która zrezygnowała z palenia, w żadnym przypadku nie może pozwolić sobie na zapalenie nawet jednego papierosa. Od tego zależy trwałość uzyskanego wyniku leczenia. Jeżeli rezultat terapii jest niezadowolający, należy przerwać leczenie i po upływie 2 do 3 miesięcy rozpocząć leczenie ponownie.

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego, jak również w przypadku:

- niestabilnej dławicy piersiowej,
- przebytego niedawno zawału serca,
- klinicznie istotnych zaburzeń rytmu serca,
- niedawno przebytego udaru mózgu,
- w okresie ciąży i karmienia piersią.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zwykle obserwuje się łagodne do umiarkowanych w nasileniu działania niepożądane, takie jak:

- dolegliwości żołądkowo-jelitowe

Ponadto może występować:

- wzmożona męczliwość,

- złe samopoczucie,
- zmęczenie,
- łzawienie oczu,
- przyspieszenie lub zwolnienie akcji serca,
- wyżki ciśnienia tętniczego,
- bóle i zawroty głowy,
- zaburzenia snu (bezsennność, senność, ospałość, dziwne sny, koszmary),
- zmiany nastroju, lęk,
- trudności w koncentracji,
- osłabienie popędu płciowego,
- duszność,
- wzmożone odkrztuszanie,
- bóle mięśniowe,
- wysypka,
- wzmożona potliwość,
- zmniejszenie elastyczności skóry,
- wzrost aktywności enzymów wątrobowych.

Wymienione działania niepożądane występują głównie w początkowym okresie leczenia i ustępują wraz z jego trwaniem. Mogą być one również wynikiem zaprzestania palenia tytoniu (objawy odstawienia), a nie przyjmowania leku TABEX.

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

- Nie należy przyjmować leku Tabex razem z lekami przeciwgruźliczymi.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności

Tabex należy stosować ostrożnie w przypadku:

- choroby niedokrwiennej serca,
- niewydolności serca,
- nadciśnienia tętniczego,
- guza chromochłonnego nadnerczy,

- miażdżycy tętnic,
- choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy,
- choroby refluksowej przełyku,
- nadczynności tarczycy,
- cukrzycy,
- niektórych postaci schizofrenii,
- niewydolności nerek i wątroby.

Ze względu na ograniczone doświadczenie kliniczne, nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 18 roku życia i pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat).

Tabex powinny przyjmować tylko osoby z poważnym zamiarem odzwyczajenia się od palenia tytoniu.

Przyjmowanie leku i kontynuacja palenia tytoniu może doprowadzić do wzmożenia działań niepożądanych nikotyny.

## Stosowanie u dzieci i młodzieży:

Ze względu na ograniczone doświadczenie, nie zaleca się stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 18 lat.

## Ciąża i karmienie piersią

Lek Tabex jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

## Prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn:

TABEX nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

## Ważne:

- TABEX zawiera laktozę
- Jedna tabletkę leku TABEX zawiera 28 mg laktozy. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

## Przechowywanie:

- Przechowywać w temperaturze poniżej 25° C.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.
- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
- Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca

## Podmiot odpowiedzialny:

Sopharma Warszawa Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa.

## Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.