

Tadalafil Mensil, 10 mg tadalafilum, potencja, 2 tabletki



Cena: 22,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Hasco-Lek
Substancja czynna	Tadalafilum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Tadalafil Mensil 10 mg - 2 tabletki

(Tadalafil)

Opis produktu:

Lek Tadalafil Mensil zawiera substancję czynną tadalafil, stosowany jest w leczeniu zaburzeń erekcji u dorosłych mężczyzn. Lek może być skuteczny do 36 godzin po przyjęciu tabletki.

Skład:

- substancję czynną: tadalafil
- pozostałe składniki: Rdzeń tabletki: Laktoza jednowodna; Celuloza mikrokrystaliczna; Hydroksypropyloceluloza; Sodu laurylosiarczan; Kroskarmeloza sodowa; Magnezu stearynian. Otoczka Opadry II Blue 85F30605: Alkohol poliwinylowy, częściowo zhydrolizowany; Tytanu dwutlenek (E 171); Makrogol 3350 i 4000; Talk; Indygokarmin, lak alumiiniowy (E 132).

Każda tabletki zawiera 10 mg tadalafilu (Tadalafilum).

Wskazania:

Leczenie zaburzeń wzrodu u dorosłych mężczyzn.

Działanie:

- Tadalafil Mensil zawiera substancję czynną tadalafil, który należy do grupy leków nazywanych inhibitorami fosfodiesterazy typu 5.
- Po stymulacji seksualnej, Tadalafil Mensil pomaga w rozszerzeniu naczyń krwionośnych członka, co umożliwia napływ krwi do członka. W wyniku tego dochodzi do poprawy erekcji.
- Aby tadalafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna.

Dawkowanie:

Lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza albo farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli mężczyźni: Zalecana dawka to jedna tabletką 10 mg, przyjmowana przed planowaną aktywnością seksualną, niezależnie od posiłków. Lek należy zażyć przynajmniej 30 minut przed planowaną aktywnością seksualną. Lek należy stosować doraźnie, w miarę potrzeby. Nie stosować częściej niż 1 raz w tygodniu.

- Lek Tadalafil Mensil może jeszcze być skuteczny do 36 godzin po przyjęciu tabletki.
- Leku Tadalafil Mensil nie należy stosować jednocześnie z innymi doustnymi lub miejscowymi lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń erekcji

Przeciwwskazania:

Stosowanie jest przeciwwskazane u pacjentów:

- z ciężkimi chorobami serca, z niestabilną dławicą piersiową;
- u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy występowała niewydolność serca co najmniej 2 stopnia według klasyfikacji NYHA, z niekontrolowanymi arytmiami, niedociśnieniem (