

## Tantum Verde 1,5 mg/ml, aerozol, 30 ml



Cena: 24,90 PLN

### Opis słownikowy

Producent /  
Marka Angelini Pharma

Substancja  
czynna Benzydaminum

Typ produktu

### Opis produktu

## Lek bez recepty

**Tantum Verde 1,5 mg/ ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej i gardle - 30 ml**  
(Benzydaminum hydrochloridum)

### Opis produktu:

Lek do stosowania na śluzówkę jamy ustnej i gardła.

Lek Tantum Verde, aerozol do stosowania w jamie ustnej i gardle, zawiera substancję czynną - benzydaminę, należącą do indolowych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) do stosowania miejscowego i ogólnego.

### Skład:

- **Substancja czynna** - benzydamina
- **Substancje pomocnicze** - glicerol, etanol 96%, metylu parahydroksybenzoesan, kompozycja smakowo-zapachowa miętowa, sacharyna, sodu wodorowęglan, polisorbata 20, woda oczyszczona.

100 ml roztworu zawiera 0,15 g benzydaminę chlorowodoru.

## Wskazania:

Leczenie objawów (ból, zaczerwienienia, obrzęku) związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła w:

- zakażeniach bakteryjnych i wirusowych,
- zapaleniu błon śluzowych po radioterapii,
- stanach po zabiegach operacyjnych w laryngologii i stomatologii,
- oraz po intubacji.

## Działanie:

Tantum Verde zawiera benzydaminę należącą do grupy leków NLPZ o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym. Benzydamina miejscowo działa również znieczulająco i odkażająco.

Tantum Verde łagodzi ból i inne objawy związane ze stanem zapalnym wynikającym z zakażenia bakteryjnego, wirusowego, a także po niektórych zabiegach jak radioterapia, intubacja, operacje stomatologiczne i laryngologiczne.

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Tantum Verde należy rozpylać na błonę śluzową jamy ustnej i gardła.

- **Dzieci w wieku poniżej 6 lat** - 1 dawka leku (rozpylenie) na 4 kg masy ciała, od 2 do 6 razy na dobę. Bez względu na masę ciała, jednorazowo nie należy przekraczać 4 dawek.
- **Dzieci w wieku od 6 do 12 lat** - 4 dawki leku, od 2 do 6 razy na dobę.
- **Dzieci w wieku powyżej 12 lat** - od 4 do 8 dawek leku od 2 do 6 razy na dobę.
- **Dorośli** - Od 4 do 8 dawek (rozpyleń) leku od 2 do 6 razy na dobę.

Każda dawka leku zawiera 0,17 ml roztworu.

Nie stosować dawki większej niż zalecana. Leczenie ciągłe nie powinno być dłuższe niż 7 dni, a o jego ewentualnym przedłużeniu powinien zdecydować lekarz.

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

**Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób) i częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):**

- reakcja alergiczna (nadwrażliwość),

- ciężka reakcja alergiczna (wstrząs anafilaktyczny), której objawy mogą obejmować trudności w oddychaniu, ból lub ucisk w klatce piersiowej i (lub) uczucie zawrotów głowy / omdlenia, silny świąd skóry lub uniesione guzki na skórze, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, oraz która może potencjalnie zagrażać życiu,
- uczucie pieczenia błony śluzowej jamy ustnej, suchość w jamie ustnej, nudności oraz wymioty, zaburzenia czucia, drętwienie, zawroty i bóle głowy, wysypka.

Benzydamina stosowana miejscowo wchłania się w niewielkiej ilości do krążenia, w związku z tym ogólne działania niepożądane występują bardzo rzadko.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Długotrwałe stosowanie może powodować reakcję uczuleniową. W przypadku wystąpienia objawów alergicznych, należy zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem.
- Tantum Verde zawiera parahydroksybenzoesan metylu, który może powodować reakcje alergiczne, także typu późnego.

### Dzieci i młodzież:

- Lek może być stosowany u dzieci poniżej 6 lat, 6-12 lat i powyżej 12 lat, a także u osób dorosłych.

### Ciąża, karmienie piersią:

- W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

## Podmiot odpowiedzialny:

Angelini Pharma Polska sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa.

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.