

Tantum Verde aerozol do jamy ustnej i gardła 30 ml import

Cena: 28,99 PLN



Opis słownikowy

Producent / Marka	PHARMAPOINT S.A.
Substancja czynna	Benzydaminum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek wydawany bez recepty

Tantum verde, aerozol do stosowania w jamie ustnej i gardle, 30 ml, import

(Benzydaminum hydrochloridum)

Import równoległy Medezin

Lek Tantum Verde, aerozol do stosowania w jamie ustnej i gardle. Do stosowania na śluzówkę jamy ustnej i gardła, leczenie objawowe: ból, zaczerwienienie, obrzęk.

Skład:

- **Substancją czynną leku jest** - benzydaminum chlorowodorek
- **Substancje pomocnicze** - glicerol, etanol 96%, metylu parahydroksybenzoesan (E218), kompozycja smakowo-zapachowa miętowa, sacharyna, sodu wodorowęglan, polisorbat 20, woda oczyszczona.

100 ml roztworu zawiera:

- 0,15 g benzydminy chlorowodoru.

Wskazania:

- leczenie objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła tj. w zakażeniach bakteryjnych i wirusowych, zapaleniu błon śluzowych po radioterapii, w stanach po zabiegach operacyjnych w laryngologii i stomatologii, a także po intubacji

Działanie:

- działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo
- miejscowo znieczulająco i odkażająco
- lek na ogół dobrze tolerowany i nadaje się do miejscowego leczenia objawów zapalenia

Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy rozpylać na błonę śluzową jamy ustnej i gardła

Zalecana dawka to:

Dorośli:

- od 4 do 8 dawek (rozpyleń) leku od 2 do 6 razy na dobę.
- każda dawka leku zawiera 0,17 ml roztworu.

Dzieci i młodzież:

- dzieci poniżej 6 lat: 1 dawka leku (rozpylenie) na 4 kg masy ciała, od 2 do 6 razy na dobę.
- bez względu na masę ciała, jednorazowo nie należy przekraczać 4 dawek
- dzieci od 6 do 12 lat: 4 dawki leku, od 2 do 6 razy na dobę
- dzieci powyżej 12 lat: od 4 do 8 dawek leku od 2 do 6 razy na dobę.

Nie stosować dawki większej niż zalecana. Leczenie ciągłe nie powinno być dłuższe niż 7 dni, a o jego ewentualnym przedłużeniu powinien zdecydować lekarz. **Sposób użycia:**

- podnieść kaniulę
- umieścić kaniulę w ustach i skierować jej wylot na obszar zmian zapalnych w jamie ustnej lub gardle
- mocno nacisnąć palcem karbowaną powierzchnię pompki do momentu uwolnienia dawki leku
- czynność tą powtórzyć odpowiednią ilość razy.

- **ważne!** przy pierwszym użyciu leku, przycisk pompki należy nacisnąć kilka razy w celu napełnienia pompki i uzyskania prawidłowego rozpylenia
- w przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe należy zwrócić się do lekarza.

Przeciwwskazania:

- nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 do 10 000 osób) i częstość nieznana (nie może być określana na podstawie dostępnych danych):

- reakcja alergiczna (nadwrażliwość)
- ciężka reakcja alergiczna (wstrząs anafilaktyczny), której objawy mogą obejmować trudności w oddychaniu, ból lub ucisk w klatce piersiowej i (lub) uczucie zawrotów głowy/omdlenia, silny świąd skóry lub uniesione guzki na skórze, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, oraz która może potencjalnie zagrażać życiu
- uczucie pieczenia błony śluzowej jamy ustnej, suchość w jamie ustnej, nudności oraz wymioty, zaburzenia czucia, drętwienie, zawroty i bóle głowy, wysypka.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

- nie są znane oddziaływania leku Tantum verde z innymi lekami.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku tantum Verde należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Stosowanie, zwłaszcza długotrwałe, leków o działaniu miejscowym, może spowodować reakcję uczuleniową. W takim przypadku lek należy odstawić i zgłosić się do lekarza, który zaleci odpowiednie postępowanie.

Ciąża i karmienie piersią

- w ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty
- lekarz decyduje o możliwości stosowania leku u kobiet w ciąży i u kobiet karmiących piersią

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

- lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie maszyn.

Lek Tantum Verde zawiera metylu parahydroksybenzoesan

- może powodować reakcje alergiczne (możliwe są reakcje typu późnego)

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- **Okres przydatności produktu leczniczego po otwarciu wynosi 6 miesięcy**

Podmiot odpowiedzialny:

Na Litwie, w kraju eksportu:

Angelini Pharma GmbH Brigittenauer Lande 50-54 1200 Wiedeń Austria

Importer równoległy:

Medezin Sp. z o.o. ul. Zbąszyńska 3 91-342 Łódź

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.