

# Tantum Verde Forte 3 mg/ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej i gardle, 15 ml



Cena: 24,90 PLN

## Opis słownikowy

Producent /  
Marka AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI  
FRANCESCO A.C.R.A.F. SPA

Substancja  
czynna Benzydaminum

Typ produktu

## Opis produktu

## Lek bez recepty

# Tantum Verde Forte 3 mg/ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej i gardle, 15 ml

(Benzydamin hydrochloridum)

## Opis produktu:

- Tantum Verde Forte zawiera substancję czynną - benzydaminę, z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

## Skład:

- Substancją czynną leku jest benzydamin chlorowodorek.
- 100 ml roztworu zawiera 0,3 g benzydamin chlorowodoru.

- **Pozostałe składniki to:** glicerol, etanol 96%, olej rycynowy uwodorniony, sacharyna sodowa, metylu parahydroksybenzoesan, kompozycja smakowo-zapachowa miętowa, woda oczyszczona.

## Wskazania:

- Lek stosuje się do leczenia objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła tj. w zakażeniach bakteryjnych i wirusowych, zapaleniu krtani, zapaleniu błon śluzowych po radioterapii, w stanach po zabiegach operacyjnych w laryngologii i stomatologii, a także po intubacji.

## Działanie:

- Tantum Verde Forte zawiera substancję czynną - benzydaminę, z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).
- Benzydamina charakteryzuje się silnym działaniem przeciwzapalnym i przeciwbólowym oraz działa miejscowo znieczulająco i odkażająco. Dzięki temu, że lek miejscowo wchłania się bardzo dobrze i osiąga wysokie stężenie w tkankach objętych procesem zapalnym, dolegliwości szybko ustępują.
- Lek jest dobrze tolerowany i nadaje się do miejscowego leczenia objawów zapalenia.

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

- Lek jest przeznaczony do stosowania przez osoby dorosłe, szczególnie przez osoby, które nie mogą płukać jamy ustnej.
- Lek należy stosować od 2 do 6 razy na dobę, po 2 - 4 dawki.
- Każda dawka zawiera 0,17 ml roztworu.
- Nie stosować dawki większej niż zalecana.
- Lek jest przeznaczony do krótkotrwałego stosowania.
- Leczenie ciągłe nie powinno być dłuższe niż 7 dni.
- Gdyby dolegliwości powtarzały się lub nasilały, należy poradzić się lekarza.
- W przypadku wrażenia, że działanie leku jest zbyt mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza

## Przeciwwskazania:

- Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działanie niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

**Niezbyt często** (rzadziej niż u 1 na 100 osób, ale częściej niż u 1 na 1000 osób):

- uszkodzenie skóry w wyniku nadwrażliwości na światło (odczyny fototoksyczne).

**Rzadko** (rzadziej niż u 1 na 1000 osób, ale częściej niż u 1 na 10 000 osób):

- pieczenie lub suchość w jamie ustnej.

**Bardzo rzadko** (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- skurcz krtani, obrzęk naczynioruchowy.

**Częstość nieznana** (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- reakcja alergiczna (nadwrażliwość),
- ciężka reakcja alergiczna (wstrząs anafilaktyczny), której objawy mogą obejmować trudności w oddychaniu, ból lub ucisk w klatce piersiowej i (lub) uczucie zawrotów głowy/omdlenia, silny świąd skóry lub uniesione guzki na skórze, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, oraz która może potencjalnie zagrażać życiu.
- nudności, wymioty, niedoczulica jamy ustnej, zawroty głowy, bóle głowy.

Miejscowe objawy są związane z działaniem farmakodynamicznym benzydamininy, która między innymi wykazuje działanie miejscowo przeciwzapalne.

Miejscowe działania niepożądane są zazwyczaj przemijające, ustępują samoistnie i rzadko wymagają dodatkowego leczenia.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką:

- Stosowanie, zwłaszcza długotrwałe, leków o działaniu miejscowym, może spowodować reakcję uczuleniową, w takim przypadku lek należy odstawić i zgłosić się do lekarza, który zaleci, odpowiednie postępowanie.

### Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

- Lekarz zdecyduje o możliwości stosowania leku u kobiety w ciąży i u kobiety karmiącej piersią.

### Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

- Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

## Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także, o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

- Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

- Nie są znane żadne oddziaływania leku Tantum Verde Forte z innymi lekami.

## Przechowywanie:

- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku oraz na etykiecie poskrócie: EXP.
- Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

## Podmiot odpowiedzialny:

Angelini Pharma S.p.A., Viale Amelia 70, 00181 Rzym, Włochy

## Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.