

Tantum Verde, smak cytrynowy, 3 mg, 20 pastylek twardych



Cena: 20,20 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI
FRANCESCO A.C.R.A.F. SPA

Substancja
czynna Benzydaminum

Typ produktu

Opis produktu

Lek bez recepty

Tantum Verde, smak cytrynowy, 3 mg, 20 pastylek twardych

(Benzydaminum hydrochloridum)

Skład:

Substancją czynną leku jest benzydaminum chlorowodorek.

Jedna pastylka twarda zawiera 3 mg benzydaminum chlorowodoru (Benzydaminum hydrochloridum), co odpowiada 2,68 mg benzydaminum

Pozostałe składniki to: izomalt (E 593), kwas cytrynowy jednowodny, kompozycja smakowozapachowa cytrynowa PHL-008469 zawiera m.in.: butylohydroksyanizol (E 320), alkohol benzylowy (E 1519), cytral, cytronellol, d-limonen, geraniol, linalol kompozycja smakowo - zapachowa miętowa PHL-008468 (zawiera m.in.: alkohol benzylowy (E 1519), cytronellol, d-limonen, eugenol, geraniol, linalol], aspartam (E 951), żółcień chinolinowa (E 104), indygotyna (E 132).

Wskazania:

- Produkt leczniczy Tantum Verde smak cytrynowy jest wskazany u osób dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat w leczeniu dolegliwości i objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanami zapalnymi jamy ustnej i gardła.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

- Produkt leczniczy zawiera aspartam, źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią. Jest przeciwwskazany u pacjentów z fenyloketonurią.

Działanie:

- W badaniach klinicznych potwierdzono skuteczność benzydamininy w usuwaniu dolegliwości związanych z zapalnymi schorzeniami jamy ustnej i gardła.
- Ponadto zaznaczone jest działanie miejscowo znieczulające benzydamininy.
- Te wszystkie właściwości są uzupełnione przez działanie antyseptyczne.
- Produkt leczniczy Tantum Verde smak cytrynowy jest na ogół dobrze tolerowany i wykazuje miejscowe działanie przeciwzapalne.

Dawkowanie i sposób podawania:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: jedna pastylka 3 razy na dobę.

- Nie stosować dawki większej niż zalecana. Leczenie ciągłe nie powinno przekraczać siedmiu dni.

Dzieci i młodzież

Dzieci w wieku od 6 do 11 lat:

- Produkt leczniczy powinien być stosowany pod kontrolą osoby dorosłej.

Dzieci w wieku poniżej 6 lat:

- Ze względu na postać farmaceutyczną, produktu leczniczego Tantum Verde smak cytrynowy nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Sposób podawania:

- Podanie na błonę śluzową jamy ustnej i gardła.
- Pastylkę należy ssać powoli. Nie połykać. Nie żuć.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Wady wrodzone, choroby rodzinne i genetyczne:

- **Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)** - Przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego u płodu

Zaburzenia żołądka i jelit:

- Rzadko (?1/10 000 do