

Tretussin Med, syrop, smak czarna porzeczka, kaszel, chrypka, podrażnienie gardła, 250 ml



Cena: 33,50 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Domowa Apteczka
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Wyrób medyczny

Tretussin Med, syrop o smaku czarnej porzeczki - 250 ml

Kaszel, Chrypka, Podrażnienie Gardła

Opis:

Tretussin Med, syrop:

- Dla dorosłych i dzieci.
- Łagodzi dolegliwości bólowe, stan zapalny oraz wspomaga regenerację błony śluzowej gardła.
- Daje uczucie nawilżenia i przynosi ulgę przy podrażnieniu gardła.
- Bez alkoholu i dodatku cukrów.

Skład:

- Ekstrakt z grzybni porostu islandzkiego 4:1, ekstrakt z korzenia prawoślazu lekarskiego 4:1, ekstrakt z liści bluszczu 4:1.
- Nie zawiera alkoholu ani dodatku cukrów.
- Zawiera naturalnie występujące cukry.

Wskazania:

- **Tretussin Med** może być stosowany przy kaszlu, podrażnieniu gardła oraz chrypcie.

Działanie:

- Wyrób medyczny **Tretussin Med** zawiera substancje ograniczające przyleganie drobnoustrojów do błony śluzowej gardła. Dzięki obecności porostu islandzkiego, błona śluzowa gardła zostaje pokryta ochronnym filmem, który daje uczucie nawilżenia i przynosi ulgę przy podrażnieniu gardła. Ochronna warstwa łagodzi dolegliwości bólowe, umożliwiając regenerację błony śluzowej, co wpływa na zwiększenie komfortu przełykania oraz zabezpiecza przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych, takich jak suche lub zimne powietrze. Dodatkowo wyciągi z korzenia prawoślazu i liści bluszczu pospolitego łagodzą podrażnienia, dolegliwości bólowe oraz stan zapalny gardła.

Stosowanie:

- **Dzieci 1-3 lata:** po konsultacji z lekarzem.
- **Dzieci 3-6 lat:** 2 x 1 łyżeczka dziennie (10 ml), o ile lekarz nie zaleci inaczej.
- **Dzieci w wieku szkolnym 7-12 lat:** 3 x 1 łyżeczka dziennie (15 ml).
- **Młodzież i osoby dorosłe:** 3 x 2 łyżeczki dziennie (30 ml).

Zaleca się nie spożywać posiłków ani płynów do 30 minut po zastosowaniu wyrobu w celu zapewnienia większej skuteczności.

Przeciwwskazania i środki ostrożności:

- Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
- Nadmierne spożycie może wywołać efekt przeczyszczający.

W przypadku ciężkiego stanu zapalnego gardła lub bólu gardła którym towarzyszy wysoka temperatura ciała, ból głowy, nudności i wymioty lub inne objawy, które utrzymują się powyżej dwóch dni - należy zgłosić się do lekarza.

Stosowanie wyrobu z jedzeniem i piciem

Zaleca się nie spożywać posiłków ani płynów do 30 minut po zastosowaniu wyrobu w celu zapewnienia jego pełnej skuteczności.

Ciąża i karmienie piersią

Preparat nie może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią.

Przechowywanie:

- Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci.
- Przechowywać w szczelnie zamkniętej butelce.
- Chronić przed światłem i wilgocią.
- Nie stosować po upływie terminu ważności.

Ważne:

- Wyrób medyczny - **posiada certyfikat CE**
- **Posiada deklarację zgodności UE.**
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim.**
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim.**