

# Undofen, Amorolfina, lakier, leczniczy, do paznokci, grzybica paznokci, 0,05g/ml, 2,5ml

Cena: 74,99 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Undofen
Substancja czynna	Amorolfinum
Typ produktu	

## Opis produktu

## Lek bez recepty

### Undofen Amorolfina 50 mg/ml lakier do paznokci leczniczy 2,5 ml

(Amorolfinum)

## Opis produktu:

Leczniczy lakier do paznokci Undofen Amorolfina to lek przeciwgrzybiczy do stosowania miejscowego. Undofen Amorolfina stosuje się w grzybicy paznokci wywołanej przez dermatofity, drożdżaki i pleśnie oraz ograniczone do dwóch paznokci oraz do górnych i bocznych części tych paznokci.

## Skład:

- Substancja czynna - amorolfina.
- Substancje pomocnicze - amoniowego metakrylanu kopolimer (typ A), triacetyna, butylu octan, etylu octan, etanol bezwodny.

1 ml lakieru zawiera 50 mg amorolfiny (co odpowiada 55,74 mg amorolfiny chlorowodorku).

## Wskazania:

- Lek Undofen Amorolfina stosuje się na grzybicę paznokci wywołaną przez dermatofity, drożdżaki i pleśnie oraz ograniczone do

dwóch paznokci oraz do górnych i bocznych części tych paznokci.

- Wskazaniem do zastosowania lakieru leczniczego **jest też grzybicze zakażenie płytki paznokciowej ze zmianą koloru płytki paznokcia** (przebarwienia koloru białego, żółtego lub brązowego) lub **zgrubieniem płytki**.

## Działanie:

- Amorolfina zawarta w lakierze działa przeciwgrzybiczo.
- Undofen Amorolfina działa na różnego rodzaju grzyby wywołujące grzybicę paznokci, jak: dermatofity, drożdżaki i pleśnie.

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek należy stosować zewnętrznym, na chore paznokcie.
- Skuteczność leczenia należy oceniać co 3 miesiące (na odrośniętej płytce paznokcia).
- Dawkowanie i szczegółowy opis stosowania leku znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.
- Lek Undofen Amorolfina stosuje się raz w tygodniu na opłukaną i odtłuszczoną powierzchnię chorych paznokci (rąk i/lub stóp).
- Lakier należy stosować ciągle do momentu zaniku zakażenia, czyli wzrostu zdrowego paznokcia.
- Czas trwania leczenia zależy od nasilenia oraz położenia zakażenia.
- W przypadku rąk czas trwania terapii to około 6 miesięcy, a stóp 9 do 12 miesięcy.

## Przeciwwskazania:

- Nie stosować lakieru leczniczego Undofen Amorolfina u osób uczulonych na amorolfinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- **Rzadko występujące działania niepożądane** (rzadziej niż u 1 na 1 000 osób): zaburzenia płytki paznokciowej, łamliwość paznokci, zmiana zabarwienia płytki paznokciowej, nadmierna kruchość paznokci z ich rozwarstwianiem się.
- **Bardzo rzadko występujące działania niepożądane** (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): pieczenie skóry.
- **Częstość nieznana**: rumień, świąd, kontaktowe zapalenie skóry, pokrzywka, pęcherzyk na skórze.

## Interakcje:

- Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- W trakcie stosowania leku nie należy nakładać na płytkę paznokcia kosmetyków w postaci lakierów do paznokci oraz stosować sztucznych paznokci.
- Przed zastosowaniem leku Undofen Amorolfina należy skonsultować się z lekarzem w przypadku osób z: cukrzycą, leczonych z powodu osłabionego układu immunologicznego, ze słabym krążeniem krwi w stopach i rękach oraz ciężko uszkodzonymi czy zakażonymi paznokciami.
- Należy używać nieprzepuszczalne rękawice ochronne jeśli pacjent ma kontakt z rozpuszczalnikami, takie postępowanie ochroni nałożony lakier leczniczy przez jego rozpuszczeniem.

### Dzieci i młodzież:

- Nie stosować leku Undofen Amorolfina u dzieci

### Ciąża, karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- Nie stosować leku Undofen Amorolfina w czasie ciąży i karmienia piersią.

## Przechowywanie:

- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 30° C.
- Chronić przed wysoką temperaturą. Przechowywać butelkę w pozycji pionowej szczelnie zamkniętą.

## Podmiot odpowiedzialny:

Perrigo Poland Sp. z o.o., Al. Niepodległości 18, Warszawa

Pojemność: 2,5ml

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

