

Undofen Max, 10 mg/g, krem, 15g



Cena: 22,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka Perrigo Poland Sp. z o.o.

Substancja
czynna Terbinafinum

Typ produktu

Opis produktu

Lek wydawany bez recepty

Undofen Max, 10 mg/g, krem, 15g

(Terbinafini hydrochloridum)

Skład:

- Substancją czynną leku jest terbinafiny chlorowodorek.
- Pozostałe składniki to: izopropylu mirystynian, alkohol cetostearylowy, olbrot syntetyczny, sorbitanu stearynian, polisorbata 60, alkohol benzylowy, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

1 g kremu zawiera 10 mg terbinafiny chlorowodorku.

Wskazania:

Zakażenia grzybicze skóry wywołane przez dermatofity:

- grzybica stóp,

- grzybica fałdów skórnych,
- grzybica skóry gładkiej.

Łupież pstry

Działanie:

- Lek zawiera substancję czynną terbinafiny chlorowodorek, który działa przeciwgrzybiczo na różne gatunki grzybów wywołujących schorzenia skóry u ludzi.
- Undofen Max działa grzybobójczo na dermatofity, pleśnie oraz niektóre grzyby dimorficzne.
- Na drożdżaki, w zależności od gatunku, działa grzybobójczo lub grzybostatycznie (hamuje wzrost grzybów).

Przeciwwskazania:

- Nadwrażliwość na terbinafinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli

- Lek Undofen Max w postaci kremu można stosować raz lub dwa razy na dobę.
- Przed nałożeniem kremu Undofen Max należy dokładnie oczyścić i osuszyć powierzchnię skóry, na którą będzie on наносzony.
- Następnie należy nanieść cienką warstwę kremu na chorobowo zmienione miejsca na skórze i wokół nich, i lekko wcierać.
- Jeżeli zmiany chorobowe znajdują się w fałdach skórnych (pod piersią, między palcami, między pośladkami, w pachwinach), można nałożyć dodatkowo opatrunek z gazy, zwłaszcza na noc.

Czas leczenia

- Grzybica stóp, fałdów skórnych, skóry gładkiej - 7 dni.
- Łupież pstry - 14 dni.

Poprawę objawów klinicznych z reguły uzyskuje się już po kilku dniach. Stosowanie niezgodne z zaleceniami lub przedwczesne przerwanie leczenia grozi nawrotem choroby.

Stosowanie u dzieci i młodzieży:

- Nie należy stosować leku u dzieci, gdyż nie badano bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku u pacjentów w tej grupie wiekowej.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku:

- U pacjentów w podeszłym wieku nie ma konieczności zmiany dawkowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

- W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Undofen Max

- W przypadku pominięcia dawki leku należy zastosować go jak najszybciej i następnie stosować lek zgodnie ze schematem dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Undofen Max

- Undofen Max należy stosować zgodnie z zaleceniami. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

- UNDOFEN MAX jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego na skórę. Może działać drażniąco na oczy.
- Należy chronić oczy przed kontaktem z produktem leczniczym.
- W przypadku przypadkowego kontaktu produktu leczniczego z oczami, należy przemyć je bieżącą wodą.
- Produkt leczniczy UNDOFEN MAX należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Produkt leczniczy UNDOFEN MAX zawiera alkohol cetostearylowy, który może powodować miejscową reakcję skórą (np. kontaktowe zapalenie skóry).
- Produkt leczniczy UNDOFEN MAX zawiera 10 mg alkoholu benzylowego w każdym g kremu.
- Alkohol benzylowy może powodować reakcje alergiczne lub łagodne miejscowe podrażnienie

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

- Nie są znane interakcje chlorowodoru terbinafiny stosowanego miejscowo na skórę z innymi lekami.

Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

- Nie ma doświadczenia klinicznego dotyczącego stosowania tego produktu leczniczego u kobiet w okresie ciąży. Badania dotyczące toksycznego działania na płód i badania płodności prowadzone na zwierzętach, sugerują brak działań niepożądanych.
- Produktu leczniczego UNDOFEN MAX nie należy stosować w okresie ciąży, o ile nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią:

- Terbinafina przenika do mleka kobiecego, dlatego produktu leczniczego UNDOFEN MAX nie należy stosować w okresie karmienia piersią. Niemowlęta i małe dzieci nie powinny mieć dostępu do leczonej skóry kobiety karmiącej piersią.

Płodność

- W badaniach na zwierzętach nie zaobserwowano toksycznego wpływu terbinafiny na płodność.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn

- UNDOFEN MAX nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Możliwe działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- W miejscu podania mogą wystąpić objawy takie jak: świąd, łuszczenie skóry, ból w miejscu podania, podrażnienie w miejscu podania, zaburzenia pigmentacji, uczucie pieczenia skóry, rumień, powstawanie strupów itp. Objawów tych nie należy jednak mylić z reakcjami nadwrażliwości, w tym wysypką, które zgłaszane są w sporadycznych przypadkach i wymagają przerwania leczenia. W razie przypadkowego kontaktu z oczami, terbinafiny chlorowodorek może powodować podrażnienia. W rzadkich przypadkach leczona infekcja grzybicza może ulec nasileniu.

Częstość występowania działań niepożądanych oszacowano następująco: bardzo często (?1/10), często (?1/100 do