


Undofen Max Spary, 10 mg/g, aerozol na skórę, roztwór, 30ml



Cena: 31,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Perrigo Poland Sp. z o.o.
Substancja czynna	Terbinafinum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Undofen Max Spary, 10 mg/g, aerozol na skórę, roztwór, 30ml

(Terbinafini hydrochloridum)

Opis:

- UNDOFEN MAX SPRAY to lek przeciwgrzybiczy do stosowania na skórę.
- Lek zawiera substancję czynną terbinafiny chlorowodorek, który działa przeciwgrzybiczo na różne gatunki grzybów wywołujących schorzenia skóry u ludzi.
- UNDOFEN MAX SPRAY działa grzybobójczo na dermatofity, pleśnie oraz niektóre grzyby dimorficzne

Skład:

- Substancją czynną leku jest terbinafiny chlorowodorek.

- 1 g aerozolu na skórę, roztworu zawiera 10 mg terbinafiny chlorowodoru
- **Pozostałe składniki to:** makrogolu eter cetostearylowy, glikol propylenowy, etanol 96%, woda oczyszczona.

Wskazania:

Wskazania do stosowania leku UNDOFEN MAX SPRAY:

Zakażenia grzybicze skóry:

- grzybica stóp,
- grzybica fałdów skórnych,
- grzybica skóry gładkiej.

Łupież pstry.

Działanie:

- UNDOFEN MAX SPRAY działa grzybobójczo na dermatofity, pleśnie oraz niektóre grzyby dimorficzne

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku UNDOFEN MAX SPRAY:

- jeśli pacjent ma uczulenie na terbinafiny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony tylko do stosowania na skórę.

Aby stosować lek właściwie należy:

- oczyścić i osuszyć powierzchnię skóry, na którą będzie on наносzony;
- zdjąć kapturek ochronny;
- przed pierwszym użyciem należy kilkakrotnie (około 3 razy) nacisnąć pompkę nim pojawi się płyn;
- lek może być używany zarówno w pozycji pionowej, jak i odwróconej;
- rozpylić niewielką ilość płynu na chorobowo zmienione miejsca na skórze i wokół nich, tak aby pokryć je w całości;
- założyć z powrotem kapturek ochronny;
- po każdorazowym zastosowaniu leku należy umyć ręce.

Dorośli

Czas leczenia:

- **Grzybica stóp, fałdów skórnych, skóry gładkiej** - 1 raz na dobę przez 7 dni.
- **Łupież pstry (Pityriasis versicolor)** - 2 razy na dobę przez 7 dni.

Poprawę objawów klinicznych z reguły uzyskuje się już po kilku dniach. Stosowanie niezgodne z zaleceniami lub przedwczesne przerwanie leczenia grozi nawrotem choroby.

Jeśli po kilku dniach od rozpoczęcia leczenia nie stwierdza się poprawy, należy zwrócić się po poradę do lekarza.

Jak postępować w czasie stosowania leku UNDOFEN MAX SPRAY

W celu zwiększenia efektu leczniczego należy zmienioną chorobowo skórę:

- Utrzymywać w czystości przez regularne mycie.
- Wycierać delikatnie, nie trzeć.
- Unikać drapania się.
- Podstawą profilaktyki chorób grzybiczych skóry jest stosowanie własnego ręcznika, ubrań osobistych oraz częste mycie

Stosowanie u dzieci i młodzieży

- Nie należy stosować leku UNDOFEN MAX SPRAY u dzieci.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W miejscu podania mogą wystąpić objawy takie jak: świąd, łuszczenie skóry, ból w miejscu podania, podrażnienie w miejscu podania, zmiana koloru skóry, uczucie pieczenia skóry, zaczerwienienie skóry, powstawanie strupów itp. Objawów tych nie należy jednak mylić z reakcjami nadwrażliwości, w tym z wysypką, które wymagają przerwania leczenia.

- **Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 10 osób):** Łuszczenie skóry, swędzenie.
- **Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 100 osób):** Zmiany skórne, strupy, zaburzenia skóry, zmiana koloru skóry, zaczerwienienie, pieczenie, ból, ból w miejscu podania, podrażnienie w miejscu podania.
- **Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 1000 osób):** Suchość skóry, kontaktowe zapalenie skóry, wyprysk, nasilenie objawów choroby w miejscu podania.

W przypadku kontaktu leku UNDOFEN MAX SPRAY z oczami może wystąpić podrażnienie oczu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

- UNDOFEN MAX SPRAY jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę. Należy stosować ostrożnie w miejscach, które są

wrażliwe na działanie alkoholu gdyż mogą być podrażnione przez zawarty w produkcie alkohol. Leku nie należy stosować na skórę twarzy.

- Należy chronić oczy przed kontaktem z lekiem. W przypadku kontaktu leku z oczami, należy umyć je dokładnie bieżącą wodą.
- W razie przypadkowej inhalacji lekiem, jeżeli wystąpią jakiegokolwiek niepokojące objawy, należy skontaktować się z lekarzem.
- UNDOFEN MAX SPRAY należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dzieci i młodzież

- Nie należy stosować leku UNDOFEN MAX SPRAY u dzieci

Lek UNDOFEN MAX SPRAY zawiera glikol propylenowy

- Lek zawiera 5 g glikolu propylenowego w 100 g roztworu.
- Glikol propylenowy może powodować podrażnienie skóry.

Lek UNDOFEN MAX SPRAY zawiera etanol

- Ten lek zawiera 23,5 g alkoholu (etanolu) w 100 g roztworu.
- Lek może powodować pieczenie uszkodzonej skór

Prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn:

- UNDOFEN MAX SPRAY nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

- Nie należy stosować leku UNDOFEN MAX SPRAY w okresie ciąży, chyba że w opinii lekarza jest to bezwzględnie konieczne.
- Nie należy stosować leku UNDOFEN MAX SPRAY w okresie karmienia piersią.
- Niemowlęta i małe dzieci nie powinny mieć dostępu do skóry matki leczonej tym lekiem.

Stosowanie innych leków:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

- Nie są znane interakcje leku UNDOFEN MAX SPRAY z innymi lekami

Przechowywanie:

- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, nie zamrażać. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:

Perrigo Poland Sp. z o.o., ul. Domaniewska 48

02-672 Warszawa

Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.