

Unguentum, Undecylenicum, maść, 30g



Cena: 24,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	CHEMA-ELEKTROMET SPÓŁDZ.PRACY
Substancja czynna	Acidum undecylenicum, Zinci undecylenas
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

UNGUENTUM UNDECYLENICUM, (50 mg + 200 mg)/g, maść, 30g

(Acidum undecylenicum + Zinci undecylenas)

Skład:

Substancje czynne: kwas undecylenowy i cynku undecylenian.

1 g maści zawiera 50 mg kwasu undecylenowego i 200 mg cynku undecylenianu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: parahydroksybenzoesan metylu (E 218) i parahydroksybenzoesan etylu (E 214)

Pozostałe substancje pomocnicze: wazelina biała, euceryna bezwodna

Wskazania:

- Miejscowe leczenie grzybicy skóry pachwin, stóp, dłoni, głowy, powierzchniowych postaci grzybicy strzygącej, łupieżu pstrego. Preparat stosowany zapobiegawczo i leczniczo.

Działanie:

- Kwas undecylenowy oraz jego sole wykazują umiarkowane działanie przeciwgrzybicze i słabsze przeciwbakteryjne.
- Kwas undecylenowy i jego sole działają grzybobójczo na dermatofity (rodzaje Epidermophyton floccosum, Trichophyton i

Microsporium) oraz słabo przeciwbakteryjnie. Działają nie tylko na grzybnię, ale także na zarodniki grzybów.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie na skórę.

- Miejsca chorobowo zmienione pokrywać 2 razy na dobę cienką warstwą maści.
- Leczenie kontynuować, pomimo ustąpienia objawów, co najmniej przez 2 do 3 tygodni.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować produktu leczniczego:

- w nadwrażliwości na kwas undecylenowy, cynku undecylenian lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- na zmiany skórne ze znacznym odczynem zapalnym;
- na błony śluzowe;
- w okolicach oczu;
- na rozległe powierzchnie skóry;
- u dzieci w wieku do 11 lat

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zaburzenia układu immunologicznego:

- **Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):** Z uwagi na zawartość parahydroksybenzoesanu etylu i parahydroksybenzoesanu metylu, produkt może powodować wystąpienie pokrzywki i uogólnionych odczynów nadwrażliwości (mogą być opóźnione). Niekiedy mogą wystąpić natychmiastowe reakcje alergiczne z pokrzywką i skurczem oskrzeli. W takim przypadku należy przerwać leczenie.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

- Rzadko (?1/10 000 do