

Urigo Junior Żel na afty pleśniawki dla dzieci 12 ml



Cena: 20,98 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	URGO SP.Z O.O.
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Wyrób medyczny

Urigo Junior żel na afty - 12 ml

Opis produktu:

- Wyrób medyczny do **leczenie aft** (owrzodzenia w jamie ustnej), zapalenia jamy ustnej i ran w jamie ustnej.
- Odpowiedni dla dzieci i dorosłych od 3. roku życia.

Działanie:

- Żel tworzy fizyczną barierę, która chroni ranę w jamie ustnej.
- Dzięki skuteczności wyselekcjonowanych naturalnych składników **zmniejsza objawy bólowe, przyspiesza proces gojenia i zmniejsza ryzyko wystąpienia dalszych stanów zapalnych.**

Skład:

Ksyloglukan (wyciąg z tamaryndowca, bogaty w polisacharydy), aloes zwyczajny (wyciąg z Aloe Barbadenis Mill), gliceryna roślinna, woda, wyciąg ze stewii (Stevia rebaudiana B.), sorbitol, karboksymetyloceluloza, poliwinylpirolidon, aromaty, dibursztynian etyloenodiaminy trisodowej, sorbinian potasu, benzoesan sodu, kwas cytrynowy.

Właściwości:

- Nie zawiera alkoholu.
- Bez cukru.
- Aby zapewnić właściwą higienę produktu, końcówkę aplikatora można opłukać czystą i zimną wodą, trzymając ją do dołu.
- Po każdym użyciu należy szczelnie zamknąć tubkę przy pomocy nakrętki.

Stosowanie:

- Za pomocą aplikatora nałożyć jedną lub dwie krople żelu bezpośrednio na ranę, aby pokryć ją w całości.
- Unikać bezpośredniego kontaktu rany z aplikatorem. Jeżeli zmiana jest trudno osiągalna, nałożyć żel czystym palcem lub gazikiem.
- Unikać dotykania nałożonego żelu językiem przez co najmniej 2 minuty - dzięki temu produkt utworzy warstwę ochronną i pozostanie dłużej na zmianie.
- Nakładać 3 lub 4 razy dziennie, lub częściej - w zależności od potrzeb.

Przeciwwskazania:

- Nie stosować w przypadku owrzodzenia jamy ustnej o średnicy większej niż 1 cm lub opryszczkowe owrzodzenie jamy ustnej (duża liczba małych owrzodzeń), które wymagają konsultacji lekarskiej.
- Nie stosować na zainfekowane rany, oparzenia i głębokie (krwawiące) rany.
- Nie stosować w przypadku alergii na pochodne kwasu salicylowego.
- Palenie tytoniu w trakcie aplikacji, w czasie schnięcia preparatu lub w pobliżu otwartej butelki jest zabronione.
- W trakcie aplikacji może pojawić się uczucie pieczenia.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Ważne:

- Posiada oznakowanie CE 0477
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera ulotkę w języku polskim.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w języku polskim.

Podmiot odpowiedzialny:

Polfa Łódź,

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.