

# Urosan fix, zioła drogi moczowe, 20 saszetek



Cena: 10,50 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Polpharma
Substancja czynna	Mixta herbis
Typ produktu	Lek ziołowy

## Opis produktu

## Lek bez recepty

## Urosan fix, zioła do zaparzania - 20 saszetek

### Opis produktu:

Urosan fix to produkt leczniczy do stosowania w łagodzeniu dolegliwości dróg moczowych.

### Skład:

**Substancje czynne:** ziele skrzypu (*Equisetum areense* L., herba), liść brzozy (*Betula pendula* Toth; *Betula pubescebs* Ehrh, folium), korzeń podróżnika (*Cicorium intybus* L., radix), liść borówki brusznicy (*Vaccinium vitis-idea* L., folium).

#### 1 saszetka zawiera:

- 0,8 g - ziele skrzypu (*Equisetum areense* L., herba),
- 0,7 g - liści brzozy (*Betula pendula* Toth; *Betula pubescebs* Ehrh, folium),
- 0,3 g - korzenia podróżnika (*Cicorium intybus* L., radix),

- 0,2 g - liści borówki brusznicy (*Vaccinum vitis-idea L., folium*).

## Wskazania:

**Urosan fix** to produkt leczniczy roślinny stosowany pomocniczo w łagodnych zaburzeniach układu moczowego i dolegliwości dróg moczowych, takich jak uczucie pieczenia podczas oddawania moczu i/lub częste oddawanie moczu.

## Działanie:

- **Urosan fix zwiększa diurezę w celu przepłukiwania dróg moczowych.**

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

**Dorośli i młodzież powyżej 12 lat:** pić 3 razy na dobę po 1 szklance ciepłego, świeżo przygotowanego naparu.

- 2 saszetki ziół zalać 1 szklanką wrzącej wody, naparzać pod przykryciem przez około 10-15 minut.
- Stosować przez okres 2-4 tygodnie.

## Przeciwwskazania:

**Nie stosować leku Urosan fix:**

- w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub rośliny z rodzin astrowatych (*Astereacea*) lub pyłek brzozy.
- w przypadku choroby wrzodowej żołądka i/lub dwunastnicy.
- u dzieci poniżej 12 lat.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

**Częstość nieznaną:**

- zaburzenia żołądkowo-jelitowe
- reakcje alergiczne

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Ze względu na zawartość związków goryczkowych u osób nadwrażliwych mogą wystąpić dolegliwości żołądkowe związane z nadkwaśnością.
- W przypadku kamicy dróg żółciowych stosować produkt tylko po konsultacji z lekarzem.
- Nie zaleca się stosowania produktu u osób z obrzękami (najczęściej kończyn dolnych) spowodowanymi niewydolnością serca

lub nerek.

- Jeśli w trakcie stosowania produktu pojawiają się takie objawy jak: gorączka, bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, bóle kurczowe lub krwimocz, należy skonsultować się z lekarzem.

#### Ciąża i karmienie piersią:

- Leku nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

#### Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Nie stosować u dzieci i młodzieży poniżej 12 lat.

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

## Przechowywanie:

- Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze nie wyższej niż 25oC.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Chronić od światła, wilgoci i wpływu obcych zapachów.

## Podmiot odpowiedzialny:

Zakłady Farmaceutyczne "POLPHARMA S.A." Pelplińska, Starogard Gdański

Masa netto: 40g

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.