

Urpsept, Herbapol, 30 tabletek drażowanych



Cena: 13,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka POZNAŃSKIE ZAKŁ. ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Substancja
czynna -

Typ produktu Lek ziołowy

Opis produktu

Lek bez recepty

Urosept, 30 tabletek drażowanych

Skład:

Substancje czynne leku:

Jedna tabletkę drażowaną zawiera:

- Wyciąg gęsty złożony z liści brzozy, korzenia pietruszki, naowocni fasoli (Extractum spissum compositum (4-7 : 1) ex: Betulae folio 4,40 cz., Petroselini radice 2,66 cz., Phaseoli pericarpio 1,00 cz., ekstrahent: metanol 90 % [v/v]) - 86,2 mg;
- Naowocnię fasoli sproszkowaną (Phaseoli pericarpium) - 78 mg;
- Wyciąg suchy z liści borówki brusznicy (Vitis idaeae folii extractum siccum (3-6 : 1), ekstrahent: woda) - 26 mg;
- Wyciąg suchy z ziela rumianku (Chamomillae herbae extractum siccum (7-9 : 1), ekstrahent:woda) - 8 mg;
- Potasu cytrynian (Kalii citras) - 19 mg;
- Sodu cytrynian (Natrii citras) - 16 mg.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza, sacharoza

Kwas cytrynowy jednowodny, Sacharoza, Laktoza jednowodna, Skrobia ziemniaczana, Magnezu stearynian, Talk, Guma arabska

suszona rozpyłowo, Indygotyna E 132, Mieszanina wosku pszczelego białego i wosku Carnauba (Capol 1295)

Wskazania:

- Urosept jest lekiem o łagodnym działaniu moczopędnym.
- Stosowany jest pomocniczo w zakażeniach układu moczowego i w kamicy dróg moczowych.

Działanie:

- Urosept jest lekiem o łagodnym działaniu moczopędnym.
- Produkt przeznaczony jest do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

- Przyjmować po 2 tabletki 3 razy na dobę, popić szklanką wody lub wg indywidualnych wskazań lekarza.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat:

- Brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania u dzieci w wieku do 12 lat

Sposób podawania:

- Podanie doustne

Czas stosowania:

- Pod kontrolą lekarza lek może być przyjmowany przez dłuższy okres czasu, również w leczeniu skojarzonym z innymi lekami.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników.

- Nadwrażliwość na substancje czynne, rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae, dawniej Compositae) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Ze względu na obecność wyciągu z korzenia pietruszki o potencjalnych właściwościach fotouczulających istnieje niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia zmian skórnych u osób o jasnej karnacji przy nadmiernej ekspozycji na światło słoneczne.

- Dotychczas nie stwierdzono wystąpienia działań niepożądanych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Nie stosować, jeśli u pacjenta występują obrzęki spowodowane niewydolnością serca i nerek.
- Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku do 12 lat ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania.
- Jeśli objawy nasilią się w trakcie stosowania leku Urosept, należy skontaktować się z lekarzem.
- Ze względu na obecność wyciągu z korzenia pietruszki o potencjalnych właściwościach fotouczulających istnieje niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia zmian skórnych u osób o jasnej karnacji przy nadmiernej ekspozycji na światło słoneczne.

Ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych

- Lek zawiera laktozę jednowodną. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy - galaktozy.
- Lek zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy - izomaltazy nie powinni przyjmować produktu leczniczego.
- Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Ciąża i karmienie piersią:

- Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania nie zaleca się stosowania produktu w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

- Urosept nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Dzieci poniżej 12 lat:

- Brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania u dzieci w wieku do 12 lat

Interakcje z innymi lekami:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

- Dotychczas nie są znane interakcje z innymi lekami.

Przechowywanie:

- Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25oC.

- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Podmiot odpowiedzialny:

Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A., ul. Towarowa 47-51, 61-896 Poznań,

Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.