

## Valused , płyn doustny, sen, uspokojenie, 90g.



Cena: 16,99 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	Hasco-Lek
Substancja czynna	Passiflora incarnata, Humulus lupulus, Valeriana officinalis
Typ produktu	

### Opis produktu

## Lek bez recepty

### VALUSED, (420 mg + 336 mg + 42 mg)/ml, płyn doustny - 90 g

(Passiflorae tinctura + Humuli lupuli tinctura + Valerianae intractum)

### Opis produktu:

- Produkt zawiera wyciągi z trzech surowców roślinnych: inkrakt z korzenia kozłka lekarskiego, nalewkę z szyszek chmielu oraz nalewkę z ziela męczennicy.
- Stosowany jest tradycyjnie jako środek o działaniu uspokajającym i ułatwiającym zasypianie.
- Skuteczność produktu oparta jest wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu

### Skład:

100 g produktu zawiera:

- nalewka z ziela męczennicy (*Passiflorae herbae tinctura*) (1:5) 45,0 g, ekstrahent: etanol 70% v/v, nalewka z szyszek chmielu (*Lupuli floris tinctura*) (1:5) 36,0 g,
- ekstrahent: etanol 80% v/v, inkrakt z korzenia kozłka lekarskiego (*Valerianae radices intractum*) (1:1) 4,5 g,
- ekstrahent: etanol 96% v/v.

**Substancje pomocnicze o znanym działaniu:** etanol, sorbitol ciekły, niekrystalizujący.

Produkt zawiera 55-65% (v/v) etanolu.

## Wskazania:

- Produkt stosowany jest tradycyjnie w okresowych stanach napięcia nerwowego, jako środek uspokajający oraz w trudnościach z zasypianiem na tle nerwowym.

## Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

### Dorośli i młodzież powyżej 12 lat

- W okresowych stanach napięcia nerwowego 2 do 3 razy dziennie po 5 ml.
- Przy trudnościach w zasypianiu 10 ml produktu jednorazowo na 1 godziny przed snem.
- Nie należy stosować produktu dłużej niż 2 tygodnie.

### Sposób podawania

- Produkt stosuje się doustnie

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować produktu:

- w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną
- w przypadku nietolerancji waleriany,
- u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Produkt jest na ogół dobrze tolerowany w zalecanych dawkach.
- W pojedynczych wypadkach wystąpiły nudności oraz przyspieszenie akcji serca (tachykardia) po podaniu ziela męczennicy.
- Obserwowano zaburzenia żołądkowo-jelitowe u osób źle tolerujących korzeń waleriany.

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

- Nie należy stosować produktu z innymi lekami o działaniu uspokajającym ze względu na możliwość nasilenia działania produktu.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

- Produkt zawiera ok. 60% etanolu, tzn. nie więcej niż 2,56 g etanolu w 5 ml, co odpowiada 65 ml piwa i 27 ml wina. Szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową. Obecność etanolu należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet w ciąży lub karmiących piersią, dzieci i osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką.
- Produkt zawiera sorbitol.
- Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem produktu.

## Dzieci i młodzież

- Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat ze względu na brak danych klinicznych w tej grupie pacjentów.

### Wpływ na płodność, ciążę i laktację

- Ze względu na zawartość etanolu oraz brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania wyciągów z korzenia kozłka, szyszek chmielu i ziela męczennicy w okresie ciąży lub karmienia piersią nie zaleca się stosowania produktu w tym okresie.

### Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn

- Ze względu na zawartość etanolu produkt może osłabiać sprawność psychoruchową. Nie zaleca się
- prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn do 2 godzin po przyjęciu produktu Valused.

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
- Przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed światłem.

## Podmiot odpowiedzialny:

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK" S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.