

Venescin, niewydolność żylna, 30 tabletek



Cena: 12,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Herbapol Wrocław
Substancja czynna	Aesculus hippocastanum, Rutosidum, Aesculinum
Typ produktu	Lek ziołowy

Opis produktu

Lek bez recepty

Venescin - 30 tabletek

(Aesculus hippocastanum, Rutosidum, Aesculinum)

Opis produktu:

- Venescin to produkt leczniczy stosowany w celu łagodzenia objawów przewlekłej niewydolności żylniej.

Skład:

- **Substancje czynne:** wyciąg suchy z nasion kasztanowca, rutozyd trójwodny, eskulina.
- **Substancje pomocnicze:** skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian, kalafonia, olej rycynowy, guma arabska, talk, sacharoza, indygotyna (E 132), żółcień chinolinowa (E 104).

1 tabletko drażowana zawiera 34,49 mg sacharozy.

1 tabletko drażowana zawiera 25 mg wyciągu suchego z nasion kasztanowca (5,5-8:1) o zawartości średnio 22 % saponin trójterpenowych w przeliczeniu na bezwodną escynę, 15 mg rutozydu trójwodnego, 0,5 mg eskuliny.

Wskazania:

- Venescin stosuje się w łagodzeniu objawów przewlekłej niewydolności żylniej.

Działanie:

- Venescin zwiększa tonus żył oraz zmniejsza przepuszczalność i zwiększa odporność mechaniczną naczyń włosowatych.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty

- **Dorośli:** 2 tabletki drażowane 3 razy na dobę.
- Jeśli po upływie 21 dni objawy nasilą się, nie nastąpi poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania:

Nie stosować leku **Venescin**:

- w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu.
- I trymestr ciąży.
- dzieci i młodzież poniżej 18 lat.

Działania niepożądane :

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- **Rzadko występujące działania niepożądane** (mogące wystąpić u 1 do 10 pacjentów na 10 000 osób): zaburzenia żołądka i jelit (nudności, bóle brzucha)

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Jeśli po upływie 21 dni objawy nasilą się, nie nastąpi poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Ciąża i karmienie piersią

- Nie stosować w I trymestrze ciąży.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

- Nie stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Stosowanie innych leków:

- Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Przechowywanie:

- Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze nie wyższej niż 25oC
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

Podmiot odpowiedzialny:

Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol" S.A. ul. Św. Mikołaja, Wrocław

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.