

# Venescin, żel, niewydolność żylna, obrzęki krwiaki, 40g



Cena: 25,99 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Herbapol Wrocław
Substancja czynna	Troxeurinum, Aesculus hippocastanum
Typ produktu	

## Opis produktu

## Lek bez recepty

### Venescin, żel - 40 g

(Troxeurinum, Aesculus hippocastanum)

### Opis produktu:

- Lek Venescin w postaci żelu, zawiera wyciąg gęsty z nasion kasztanowca o zawartości 17% escyny i trokserutyn.

### Skład:

100 g żelu zawiera:

**Substancje czynne:** Hippocastani seminis extractum spissum: 11,8 g, Ekstrahent: etanol 70%, Troxeurinum: 2,0 g

**Substancje pomocnicze:** Carbopol 5984, glicerol, glikol propylenowy, etanol, parahydroksybenzoesan metylu, parahydroksybenzoesan propylu, wodorotlenek sodu, woda. ad 100 g

### Wskazania:

- Venescin żel stosuje się w początkowych objawach przewlekłej niewydolności żylną (w bólu, uczuciu ciężkości i puchnięciu nóg, kurczach łydek oraz w przypadku objawów występujących po urazach (obrzęki, krwiaki).

## Działanie:

- Przyjmuje się, że produkt zawierający połączenie escyny oraz trokserutyny, wpływa na naczynia żyłne m.in. zmniejszając ich przepuszczalność oraz wpływa na napięcie żyłne. Żel działa przeciwobrzękowo.

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek do stosowania zewnętrznego: nakładać 2 razy dziennie (zaleca się stosowanie rano i wieczorem).
- Niewielką ilość żelu (ok. 2 cm) po nałożeniu delikatnie wcierać.

## Przeciwwskazania:

Kiedy nie należy stosować leku **Venescin żel**:

- przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku
- na otwarte rany, błony śluzowe i obszary skóry poddane napromienieniu w radioterapii

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek Venescin może powodować działania niepożądane:

- podrażnienie skóry i błon śluzowych
- wystąpienie alergii
- wystąpienie pokrzywki, a także uogólnione opóźnione odczyny nadwrażliwości takie, jak kontaktowe zapalenie skóry, niekiedy odczyny natychmiastowe z pokrzywką i skurczem oskrzeli
- podrażnienie i suchość skóry.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Lek zawiera glikol propylenowy - może powodować podrażnienie skóry.
- Lek zawiera metylu parahydrokstbenzoesan - może powodować reakcje alergiczne.

### Ciąża i karmienie piersią

- Lek Venescin nie powinien być stosowany u kobiet w ciąży lub karmiących piersią bez zasięgnięcia porady lekarza.

## Interakcje:

- Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.
- Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

## Przechowywanie:

- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25 st.C.

## Podmiot odpowiedzialny:

Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol" S.A., Ul. Świętego Mikołaja 65/68, Wrocław

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym