

# Venoruton, forte, 500mg, żylaki, niewydolność żylna, ciężkość nóg, hemoroidy, 60tabletek



Cena: 58,99 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Stada
Substancja czynna	Oxerutinum
Typ produktu	

## Opis produktu

## Lek bez recepty

### Venoruton forte, 500mg - 60 tabletek

### (Oxerutinum)

### Opis:

Venoruton Forte to lek w postaci tabletek, który chroni naczynia żyłne, stabilizuje ścianę żylną, co powoduje zmniejszenie obrzęku. Venoruton Forte stosuje się w obrzęku nóg, niewydolności żylniej (żylaków podudzi), hemoroidach.

### Skład:

Substancją czynną leku są o-(β-hydroksyetylo)-rutozydy (O-(beta-hydroxyethyl)-rutosidea (Oxerutins)).

Substancje pomocnicze: glikol polietylenowy 6000, magnezu stearynian.

1 tabletkę zawiera 500 mg o-(β-hydroksyetylo)-rutozydów.

### Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza.

Lek stosuje się doustnie.

**Dorośli:**

- **dawkowanie początkowe:** 1 tabletkę dwa razy na dobę, aż do całkowitego ustąpienia objawów (zwykle przez 2 do 4 tygodni),
- **dawkowanie podtrzymujące:** 1 tabletkę 1 raz na dobę (przez kilka tygodni).

**Wskazania:**

- objawowe leczenie przewlekłej niewydolności żyłnej (żylaki podudzi),
- zmniejszanie obrzęków a także łagodzenie objawów typu: uczucie mrowienia i pieczenia, ból oraz skurcze mięśni, uczucie ciężkich, spuchniętych i bolących nóg,
- leczenie objawowe hemoroidów,
- pomocniczo przy mikroangiopatiach w przebiegu cukrzycy,
- żylaki i inne schorzenia naczyń kończyn dolnych.

**Działanie:**

- **Venoruton Forte** wpływa na elastyczność naczyń oraz ścianę żylną stabilizując ją, co powoduje zmniejszenie przepuszczalności dla płynów i elementów morfotycznych krwi. Efektem tego działania jest zmniejszona przepuszczalność naczyń i zmniejszenie obrzęku.

**Przeciwwskazania:**

- Nie należy stosować leku jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

**Działania niepożądane:**

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

**Rzadko występujące działania niepożądane** (u 1 do 10 na 1000 osób):

- zaburzenia przewodności pokarmowej (w tym: wzdęcia, biegunki, bóle brzucha, dyskomfort w żołądku, niestrawność),
- świąd.

**Bardzo rzadko występujące działania niepożądane** (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- zawroty głowy, bóle głowy,
- zmęczenie,
- nagłe zaczerwienienie twarzy.

**Ostrzeżenia i środki ostrożności**

- Przed rozpoczęciem przyjmowania **Venoruton forte** należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli występują obrzęki w

okolicy kostek, które są wynikiem chorób serca, wątroby lub nerek, ponieważ lek nie jest skuteczny w tych przypadkach.

#### Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

**Ciąża:** Nie zaleca się stosowania o-(beta -hydroksyetyloj-rutozydów w pierwszych trzech miesiącach ciąży.

#### Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

- Leku **Venoruton forte** nie zaleca się stosować u dzieci.

#### Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

- W rzadkich przypadkach u pacjentów stosujących ten lek obserwowano zmęczenie i zawroty głowy. W przypadku wystąpienia takich objawów nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn

## Stosowanie innych leków:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

## Przechowywanie:

- Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
- Nie stosować po upływie terminu ważności
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią

## Podmiot odpowiedzialny:

Stada Arzneimittel AG, Stadstrasse2-18, Niemcy

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.