

# Venożel, żel, przeciwbolowy, przeciwzapalny, przeciwobrzękowy, 100 g @



Cena: 46,99 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Bausch Health Ireland
Substancja czynna	Diclofenacum, Tribenosidum, Escinum
Typ produktu	

## Opis produktu

### Venożel żel - 100 g

(Diclofenacum, Tribenosidum, Escinum)

#### Opis produktu:

Venożel to lek przeciwbólowy i przeciwzapalny oraz zmniejszający obrzęk w formie żelu do stosowania na skórę. Lek zawiera 3 składniki aktywne: diklofenak z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, a także trybenozyd m.in. wspierający naczynia krwionośne oraz przeciwobrzękową escynę. Venożel stosuje się w zapaleniu żył kończyn dolnych, obrzękach, pourazowych bólach mięśni oraz stawów, a także w łagodnych i ograniczonych zapaleniach stawów. Żel można stosować u dorosłych oraz młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

#### Składniki:

- **Substancja czynna** - diklofenak sodowy, trybenozyd, escyna
- **Substancje pomocnicze** - etylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, karbomer, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

1 g leku zawiera: 12 mg diklofenaku sodu, 10 mg trybenozydu, 5 mg escyny.

#### Wskazania:

- w obrzękach pooperacyjnych i pourazowych oraz zastoinowych w kończynach dolnych; zapaleniu żył kończyn dolnych; zespołach bólowych, towarzyszących chorobom kręgosłupa; pourazowych bólach mięśni i stawów po urazach (stłuczenia,

zwknięcia, naderwania) czy łagodnych i ograniczonych postaciach zapalenia stawów.

## Działanie:

- Venożel zawiera 3 substancje czynne o uzupełniającym się działaniu.
- Diklofenak, należący do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) zmniejsza ból i stan zapalny.
- Trybenozyd również działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo, a także wspiera prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwionośnych oraz stawów.
- Escyna przeciwdziała wysiękom, obrzękom oraz stanom zapalnym.

## Dawkowanie:

Lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza albo farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- 

Venożel należy stosować miejscowo na skórę, u dorosłych 3 do 4 razy na dobę, w odstępach kilkugodzinnych.

- 

Ilość użytego żelu należy dostosować do rozmiarów miejsca zmienionego chorobowo.

- 

Najczęściej zaleca się jednorazowo użyć pasek żelu o długości około 4 cm.

- 

Po aplikacji, produkt leczniczy rozprowadzić i delikatnie wmasować do całkowitego wchłonięcia.

- 

Po zastosowaniu produktu należy umyć ręce, chyba, że to ręce są miejscem leczonym.

Nie stosować dłużej niż przez 4 tygodnie.

- 

W przypadku, gdy objawy nasilają się albo nie ustępują po 7 dniach stosowania należy skonsultować się z lekarzem.

## Przeciwwskazania:

- Nie stosować Venożelu u pacjentów z nadwrażliwością na diklofenak, trybenozyd, escynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku. Przeciwwskazaniami do zastosowania leku są: uszkodzenia, zmiany zapalne skóry oraz otwarte rany, a także

występowanie napadów astmy, pokrzywki czy ostrych nieżytów nosa po kwasie acetylosalicylowym albo innych NLPZ.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

**Rzadko występujące działania niepożądane Venożelu** (u 1 do 10 osób na 10 000) to: miejscowe podrażnienie skóry (rumień, pieczenie, świąd, wysypka, reakcje nadwrażliwości na światło, obrzęk), które przemijają po zaprzestaniu stosowania leku.

W przypadku długotrwałego stosowania leku na duże powierzchnie skóry, mogą wystąpić objawy niepożądane wynikające z ogólnego działania diklofenaku (np. nudności, biegunka, bóle brzucha, bóle głowy, zapalenie skóry, obrzęk naczynioruchowy, wysypka grudkowata). Częstość występowania tych reakcji jest nieznana. W takich przypadkach należy powiadomić lekarza.

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

- Podczas prawidłowego stosowania wystąpienie interakcji substancji czynnych leku z innymi lekami jest mało prawdopodobne.
- Venożel można stosować jednocześnie z innymi postaciami farmaceutycznymi diklofenaku, trybenozydu i escyny (tabletki, czopki itp.).
- Jednakże w przypadku długotrwałego stosowania leku na duże powierzchnie skóry nie można całkowicie wykluczyć oddziaływania składników leku Venożel z innymi lekami.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Nie stosować leku do oczu lub na błony śluzowe.
- W przypadku, gdy żel dostanie się we wspomniane miejsca należy obficie spłukiwać wodą.
- W czasie terapii oraz 2 tygodnie po jej zakończeniu zaleca się unikania bezpośredniej ekspozycji na słońce i światła solarium.
- Venożel zawiera metylu parahydroksybenzoesan oraz propylu parahydroksybenzoesan, które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

### Ciąża i karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

### Ciąża:

- W trzecim trymestrze ciąży stosowanie leku Venożel jest przeciwwskazane.
- Ze względu na niewystarczającą ilość danych klinicznych, nie zaleca się stosowania leku Venożel podczas pierwszych 6 miesięcy ciąży. W tych przypadkach Venożel można stosować jedynie wtedy, gdy w opinii lekarza korzyść z zastosowania leku u matki przewyższa potencjalne zagrożenie dla płodu.

### Karmienie piersią:

- Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
- Stosowanie leku Venożel u kobiet karmiących piersią jest przeciwwskazane.

#### Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 12 lat.

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.
- Okres ważności po pierwszym użyciu: 2 lata.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

## Podmiot odpowiedzialny:

Bausch Health Ireland Limited Lake Drive Citywest Business 3013 Campus Dublin 24, D24PPT3 Irlandia

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.