

# Vicks Vaporub maść do nacierania pleców i klatki piersiowej, 100 g Delfarma



Cena: 28,99 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Procter & Gamble
Substancja czynna	Productum compositum
Typ produktu	

## Opis produktu

## Lek bez recepty

### Vicks VapoRub maść do nacierania pleców i klatki piersiowej, 100 g

#### Opis produktu:

Vicks VapoRub to lek w postaci maści, stosowany przy objawach podrażnień oraz stanów zapalnych błony śluzowej nosa i gardła.

Maść zawiera substancje łagodzące dolegliwości górnych dróg oddechowych w katarze

#### Skład:

Substancjami czynnymi leku są:

- levomentol (Levomenthofum)
- kamfora racemiczna (Camphora racemica)
- olejek eukaliptusowy (Eucalypti aetheroleum)

- olejek terpentynowy (Terbinthinae aetheroleum a Pino pinastro)

#### Substancje pomocnicze:

- tymol
- olejek cedrowy
- wazelina biała

100 g Vicks VapoRub zawiera 2,75 g lewomentolu, 5 g kamfory racemicznej, 1,5 g olejku eukaliptusowego, 5 g olejku terpentynowego

## Wskazania:

- objawy podrażnień i stanów zapalnych błony śluzowej nosa i gardła
- kaszel, katar z obrzękiem błon śluzowych nosa i uczuciem utrudnienia oddychania (zatkanego nosa)

## Działanie:

- Lewomentol i kamfora** łagodzą obrzęk śluzówek małżowin nosowych oraz kaszel poprzez działanie łagodnie znieczulające
- Olejek eukaliptusowy i olejek terpentynowy** pobudzają wydzielanie śluzu w górnych drogach oddechowych i wzmagają odkrztuszanie

## Dawkowanie:

Lek dla bezpieczeństwa stosuj zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

**Lek podaje się na skórę. Nie połykać!**

Maść stosuje się do nacierania klatki piersiowej i pleców oraz pośrednio do inhalacji poprzez parujące składniki lotne. Parowaniu składników lotnych, a tym samym skuteczniejszej inhalacji, sprzyja przewiewne ubranie.

**Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia:**

- 1 łyżeczkę maści (około 7,5 g) wcierać w skórę klatki piersiowej i pleców 2 do 4 razy dziennie.

**Dzieci od 5 do 12 roku życia:**

- 1/2 łyżeczki maści (około 3,75g) wcierać delikatnie w skórę klatki piersiowej i pleców 2 do 3 razy dziennie.

**W przypadku utrzymywania się objawów po upływie 7 dni lub pojawi się gorączka czy pogorszenie należy skontaktować się z lekarzem**

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego

- na uszkodzoną skórę, skaleczenia i błony śluzowe
- jeśli pacjent cierpi na czynną astmę oskrzelową i inne choroby dróg oddechowych oraz stwierdzono u niego nadwrażliwość dróg oddechowych
- u dzieci poniżej 5 roku życia

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- lek nie jest przeznaczony do sporządzania inhalacji z parą wodną
- leku nie należy stosować bezpośrednio do nosa, oczu, jamy ustnej, na twarz lub szyję

### należy zachować szczególną ostrożność w przypadku pacjentów:

- nadwrażliwych na perfumy i rozpuszczalniki
- cierpiących na epilepsję oraz u których występują drgawki

Nie należy bandażować miejsca nałożenia maści

Nie stosować ciepłych okładów ani żadnego innego rodzaju ciepła

### Ciąża i karmienie piersią:

- w okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem
- nie należy stosować leku bez konsultacji z lekarzem
- nie stosować na klatkę piersiową w okresie karmienia piersią

## Przechowywanie:

- przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
- przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca
- chronić przed wilgocią.

## Import równoległy:

Delfarma Sp. z o.o., ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 111, 91-222 Łódź.

## Podmiot odpowiedzialny w kraju eksportu:

Procter & Gamble Hellas MEPE Ag. Konstantinou 49, 151 24 Maroussi, Ateny, Grecja.

## Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.