


Vitaminum E, 300mg/ml, Krople, Meda, 10ml



Cena: 9,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Polpharma
Substancja czynna	Tocopherolum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Vitaminum E, 300mg/ml, Medana - 10ml

(Tocopherolum)

Opis produktu:

- **Vitaminum E Medana** to produkt leczniczy zawierający tokoferol (witaminę E) o właściwościach przeciwutleniających do stosowania w stanach niedoboru, zaburzeniach przemiany materii, wspomagająco w chorobach przebiegających z nasilonym tworzeniem się wolnych rodników.

Skład:

- **Substancją czynną** jest: witamina E (int-rac-?-Tocopherylis acetatas).
- **Substancje pomocnicze:** olej arachidowy oczyszczony.

1 ml (ok. 27 kropli) zawiera 300 mg all-rac-?-tokoferylu octanu.

1 kropla zawiera około 11 mg all-rac- α -tokoferylu octanu.

Wskazania:

- w leczeniu stanów niedoboru w długotrwałym, nieprawidłowym odżywianiu oraz zaburzeniach przemiany materii. Niedobory mogą być związane z dziedzicznymi zaburzeniami metabolizmu lipidów (tłuszczów), jak abetalipoproteinemia, z zespołem złego wchłaniania lub mukowiscydozą,
- wspomagająco w chorobach o pochodzeniu związanym ze wzmożonym wytwarzaniem wolnych rodników, np. w miażdżycy i chorobie niedokrwiennej serca,
- wspomagająco w leczeniu zakrzepowego zapalenia żył; w okulistyce w leczeniu retinopatii miażdżycowej i nadciśnieniowej.

Działanie:

- **Vitaminum E Medana** zawiera witaminę E, która posiada właściwości antyoksydacyjne. Witamina E chroni komórki przed wolnymi rodnikami tlenowymi i nadtlenkami lipidowymi.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty

- Lek do stosowania doustnego.
- Lek należy podawać w łyżeczce płynu.
- Dla dokładnego odmierzenia zalecanej dawki, butelkę z kroplomierzem należy trzymać pod kątem 45°
- **Stosowanie u dzieci wyłącznie z przepisu lekarza!**
- W przypadku innych niedoborów witaminy E, dawkowanie jest ustalane indywidualnie w zależności jego stopnia.
- Leku nie należy stosować bezpośrednio z butelki do ust

Dawka dobową

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 15 lat:

- **profilaktycznie:** 3 krople na dobę
- **mukowiscydoza:** 100-200 mg na dobę (w przepisu lekarza)
- **abetalipoproteinemia:** 50 - 100 mg/kg mc. na dobę (z przepisu lekarza).

Przeciwwskazania:

Nie stosować leku **Vitaminum E Medana**:

- jeśli pacjent ma uczulenie na witaminę E, olej arachidowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli występuje niedobór witaminy K (możliwość wystąpienia krwawień).

Działania niepożądane :

Dawki przekraczające 1200 mg na dobę mogą powodować wystąpienie takich objawów jak:

- ból głowy
- zaburzenia ostrości widzenia
- nudności, biegunka,
- wysypka,
- osłabienie,
- zmęczenie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- **Vitaminum E Medana** zawiera olej z orzeszków ziemnych (arachidowy). Nie należy stosować tego leku w przypadku uczulenia na orzeszki ziemne lub soję.
- Pacjenci stosujący doustne leki przeciwzakrzepowe (pochodne kumaryny, warfaryna), estrogeny (np. w postaci doustnej antykoncepcji), witaminę K, powinni zachować ostrożność stosując **witaminę E**.
- Stosowanie witaminy E razem z substancjami o działaniu przeciwutleniającym (witamina C, selen, ubichinon) mogą łagodzić objawy niedoboru witaminy E.
- **Po pierwszym otwarciu butelki lek należy zużyć w ciągu 2 miesięcy.**

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem

- Lek należy przyjmować w czasie lub po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

- Stosowanie leku u dzieci jedynie na zalecenie lekarza.

Stosowanie innych leków:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Vitaminum E Medana może wchodzić w interakcje z:

- witaminą K,
- lekami przeciwzakrzepowymi,

- estrogenami,
- żelazem (należy zachować kilkugodzinny odstęp czasu pomiędzy preparatami),
- orlistatem.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko
- Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Podmiot odpowiedzialny:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma ul.Pelplińska 19 83-200 Starogard Gdański

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.