


Vitaminum E Medana 200 mg, 20 kapsułek



Cena: 6,99 PLN

Opis słownikowy

| | |
|----------------------|--------------|
| Producent / Marka | Polpharma |
| Substancja czynna | Tocopherolum |
| Typ produktu | |

Opis produktu

Lek bez recepty

Vitaminum E Medana 200mg - 20 kapsułek elastycznych

(Int-rac- α -Tocopherylis acetat)

Opis produktu:

Vitaminum E Medana jest to produkt leczniczy przeznaczony do stosowania w leczeniu niedoboru witaminy E która jest czynnikiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Skład:

- Substancja czynna - all-rac- α -tokoferylu octan (int-rac- α -Tocopherylis acetat)
- Substancje pomocnicze - żelatyna, glicerol, parahydroksybenzoesan etylu (E214), koszenila (E120), woda oczyszczona

1 kapsułka zawiera 200 mg all-rac- α -tokoferylu octanu.

Wskazania:

- Leczenie niedoboru witaminy E spowodowanego długotrwałym nieprawidłowym odżywianiem się oraz zaburzeniami przemiany materii.

- Wspomagająco w miażdżycy, chorobie niedokrwiennej serca i jej wtórnej profilaktyce oraz we wszystkich chorobach, których etiologia związana jest ze stresem oksydacyjnym.

Działanie:

- Substancja czynna leku - witamina E jest czynnikiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmu, który chroni przed szkodliwym działaniem nadmiernych ilości związków o silnych właściwościach utleniających oraz zapobiega hemolizie czerwonych krwinek.
- Ochrona przed uszkodzeniem przez rodniki tlenowe wydaje się istotna w rozwoju i funkcjonowaniu układu nerwowego oraz mięśniowego.
- Witamina E może także działać jako kofaktor w niektórych układach enzymatycznych (składnik niezbędny w pewnych procesach przemiany materii).

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty

Dorośli: 1 lub 2 kapsułki na dobę.

- Podanie doustne.
- Kapsułkę należy połknąć i popić wodą.
- Leczniczco w stanach niedoboru witaminy E dawkowanie ustala lekarz.

Przeciwwskazania:

Nie stosować leku **Vitaminum E Medana**:

- jeśli pacjent ma uczulenie na witaminę E lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli występuje niedobór witaminy K (możliwość wystąpienia krwawień).

Działania niepożądane :

Dawki przekraczające 1200 mg na dobę mogą powodować wystąpienie takich objawów jak:

- ból głowy,
- zaburzenia ostrości widzenia,
- nudności,
- biegunka,
- wysypka,
- osłabienie,
- zmęczenie.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

- Witamina E może działać antagonistycznie do witaminy K, zwłaszcza u osób przyjmujących doustne leki przeciwzakrzepowe lub estrogeny (np. doustne środki antykoncepcyjne).
- Stosowanie innych środków o działaniu przeciwutleniającym (witamina C, selen, ubichinon, aminokwasy zawierające siarkę) może łagodzić niektóre objawy niedoboru witaminy E.
- Jednoczesne stosowanie związków żelaza osłabia działanie witaminy E, dlatego należy zachować kilkugodzinny odstęp między przyjmowaniem tych leków.
- Witamina E zwiększa wchłanianie, wykorzystanie i magazynowanie witaminy A.
- Kolestyramina i kolestypol (leki zmniejszające stężenie cholesterolu) zmniejszają wchłanianie witaminy E z przewodu pokarmowego.
- Orlistat (lek zmniejszający przyswajanie tłuszczu) i oleje mineralne mogą zaburzać wchłanianie witaminy E z przewodu pokarmowego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- **Vitaminum E Medana** zawiera parahydroksybenzoesan etylu. Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

Podmiot odpowiedzialny:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma ul. Pelplińska 19 83-200 Starogard Gdański

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

