

## Xylorin 550 µg/ml, aerozol do nosa, roztwór 18ml



Cena: 19,99 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	Perrigo Poland Sp. z o.o.
Substancja czynna	Xylometazolinum
Typ produktu	

### Opis produktu

## Lek bez recepty

### Xylorin 550 µg/ml, aerozol do nosa, roztwór 18ml

(Xylometazolini hydrochloridum)

#### Skład:

**Substancja czynna:** ksylometazoliny chlorowodorek (Xylometazolini hydrochloridum).

1 ml roztworu zawiera 550 mikrogramów ksylometazoliny chlorowodorku (Xylometazolini hydrochloridum).

1 dawka aerozolu zawiera 50 mikrogramów ksylometazoliny chlorowodorku.

**Substancje pomocnicze:** o znanym działaniu: chlorek benzalkoniowy 0,018 mg/dawkę, co odpowiada 0,2 mg/ml, sodu octan bezwodny, kwas octowy, sodu chlorek, woda oczyszczona.

#### Wskazania:

- Wskazaniem do stosowania produktu Xylorin jest leczenie objawowe zapalenia błony śluzowej nosa (w tym alergicznego) i zatok przynosowych.

- Produkt jest stosowany miejscowo w celu zmniejszenia przekrwienia błony śluzowej nosa występującego w zapaleniu błony śluzowej nosa (w tym alergicznego) i zapaleniu zatok przynosowych oraz wspomagająco w leczeniu zapalenia ucha środkowego będącego następstwem przeziębienia.

## Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą:

- jaskra z wąskim kątem przesączania,
- nadwrażliwość na produkty adrenergiczne,
- przyjmowanie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych,
- przyjmowanie inhibitorów MAO,
- zanikowe lub suche zapalenie błony śluzowej nosa,
- po zabiegach usunięcia przysadki i po zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej.

## Działanie:

Ksylometazolina jest produktem sympatykomimetycznym, działającym na receptory  $\alpha$ -adrenergiczne, stosowanym miejscowo. Powoduje skurcz drobnych tętniczek nosa, zmniejszając obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa. Prowadzi to do udroźnienia nosa, ułatwia oddychanie przez nos i zmniejsza ilość zalegającej wydzieliny.

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

### Dzieci w wieku 6 – 12 lat:

- 1 do 2 dawek aerozolu do każdego otworu nosowego co 10-12 godzin przez 3 do 5 dni.

### Młodzież w wieku powyżej 12 lat i dorośli:

- 1 do 2 dawek aerozolu do każdego otworu nosowego co 10-12 godzin przez 3 do 7 dni.

Nie należy stosować ksylometazoliny chlorowodoru 550  $\mu\text{g}/\text{ml}$  u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki dobowej ani określonej liczby dawek.

### Sposób podawania:

Produkt podaje się donosowo.

### Przed podaniem produktu należy:

- oczyścić nos,
- zdjąć nasadkę ochronną z butelki,

- butelkę trzymać w pozycji pionowej z aplikatorem do góry,
- końcówkę aplikatora włożyć do otworu nosowego i nacisnąć. W tym czasie oczy i usta
- powinny być zamknięte,
- po użyciu założyć nasadkę ochronną.

Nie demontować pompki.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniższe działania niepożądane zestawiono według klasyfikacji układów i narządów MedDRA oraz częstości występowania. Do klasyfikacji działań niepożądanych zastosowano następującą konwencję: bardzo często (?1/10), często (?1/100 do