

Ziaja, Clotrimazolum, krem na grzybicę, 20g



Cena: 4,48 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Ziaja
Substancja czynna	Clotrimazolum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Clotrimazolum Ziaja 10mg/g, krem - 20 g

(Clotrimazolum)

Opis produktu:

Clotrimazolum Ziaja to lek w postaci kremu, który zawiera klotrymazol, będący pochodną imidazolu o działaniu grzybobójczym.

Skład:

- **Substancją czynną leku jest:** klotrymazol (Clotrimazolum).
- **Substancje pomocnicze:** alkohol benzylowy, sorbitanu stearynian, polisorbát 60, cetylu palmitynian, oktylododekanol. alkohol cetostearylowy, woda oczyszczona.

1 g kremu zawiera 10 mg klotrymazolu.

Wskazania:

Clotrimazolum Ziaja zaleca się w przypadku:

- grzybic skóry, które zostały wywołane przez różne gatunki dermatofitów, zwłaszcza: grzybica pachwin, dłoni, stóp, grzybica międzypalcowa, łupież pstry,

- kandydozy skóry oraz błon śluzowych zewnętrznych narządów płciowych.

Działanie:

- Klotrymazol hamuje rozwój większości grzybów powodujących zakażenia skóry u ludzi.
- **Clotrimazolium Ziaja** posiada na szerokie spektrum działania grzybobójczego: dermofity - Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton; drożdżaki – Candida, grzyby pleśniowe i grzyby dimorficzne.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek do stosowania miejscowego na skórę.
- Zwykle chorobowo zmienione miejsca smaruje się cienką warstwą **Clotrimazolium Ziaja** od 2 do 3 razy na dobę, przy tym lekko wcierając.
- Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem. Leczenie należy kontynuować po ustąpieniu objawów chorobowych przez minimum 4 tygodnie.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować w przypadku uczulenia na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,

- Leku **Clotrimazolium Ziaja** nie należy stosować dopochwowo.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 1000 leczonych pacjentów):

- reakcje skórne (zaczerwienienia skóry, pieczenie, podrażnienie);
- mogą wystąpić ogólnoustrojowe reakcje alergiczne, ból oraz reakcje miejscowe, jak świąd i wysypka.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

- Klotrymazol może hamować działanie innych, miejscowo stosowanych leków przeciwgrzybiczych, szczególnie antybiotyków polienowych, jak nystatyna, natamycyna.
- Klotrymazol zmniejsza działanie terapeutyczne amfoterycyny B.
- Produkt leczniczy zawiera alkohol cetostearylowy co może powodować miejscową reakcję skórą (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- W przypadku stosowania na błony śluzowe zewnętrznych narządów płciowych **Clotrimazolum Ziaja** może uszkadzać środki antykoncepcyjne wykonane z lateksu (prezerwatywy oraz krążki domaciczne), z tego powodu odradza się ich stosowanie podczas terapii tym lekiem.
- Nie należy stosować środków antykoncepcyjnych wykonanych z lateksu co najmniej przez 5 dni po zastosowaniu leku.
- Należy unikać kontaktu leku z oczami i ustami.

Ciąża, karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Lek przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Podmiot odpowiedzialny:

Ziaja, Zakład Produkcji Leków, Jesienna, 9, Gdańsk

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.