

Zinkorot, 25 mg, cynk, niedobór cynku, 50 tabletek



Cena: 28,00 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka Woerwag Pharma

Substancja
czynna Zincum

Typ produktu

Opis produktu

Lek wydawany bez recepty

Zinkorot 25 mg Zn²⁺ - 50 tabletek

(Zinci ortas dihydricus)

Opis produktu:

Tabletki Zinkorot to lek uzupełniający niedobory cynku. Lek stosuje się w przypadku gdy uzupełnianie niedoborów cynku dietą jest niewystarczające. Zinkorot można stosować u dorosłych oraz dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Skład:

- Substancją czynną leku jest cynk w formie orotonianu cynku dwuwodnego (Zinci orotas dihydricus).
- Substancje pomocnicze: krzemionka koloidalna bezwodna, celuloza mikrokryształiczna, powidon K-30, kroskarmeloza sodowa, talk, magnezu stearynian.

1 tabletkę zawiera 25 mg cynku w postaci 157,36 mg orotonianu cynku dwuwodnego.

Wskazania:

- Wskazaniem do zastosowania tabletek Zinkorot są niedobory cynku, których pacjent nie może uzupełnić dietą.

Działanie:

Działanie tabletek Zinkorot polega na uzupełnianiu niedoborów cynku.

- Cynk to pierwiastek występujący w śladowych ilościach w organizmie, ale jest niezbędny do jego prawidłowego funkcjonowania. Pierwiastek ten wpływa na czynności układu odpornościowego, gojenie się ran, odczuwanie smaku i zapachu.
- Cynk odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu tarczycy, procesach rozwoju oraz wzrostu, czynnościach układu nerwowego a także działaniu insuliny.

Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek podaje się doustnie, popijając odpowiednią ilością płynu. Nie łączyć tabletek Zinkorot z jedzeniem.
- Tabletki można dzielić na połowy.
- O czasie trwania leczenia decyduje lekarz.
- Zwykle stosowane dawkowanie leku Zinkorot zależy od wieku pacjenta.
- U dorosłych oraz młodzieży w wieku 12 do 17 lat zwykle stosuje się 12,5 do 25 mg cynku, czyli od pół do 1 tabletki dziennie.
- W przypadku dzieci w wieku od 6 do 11 lat dawkowanie wynosi pół tabletki na dobę.

Przeciwwskazania:

- Przeciwwskazaniem do zastosowania leku Zinkorot jest nadwrażliwość na orotonian cynku lub którykolwiek z pozostałych składników.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

-

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów): na początku leczenia, sole cynku mogą powodować bóle brzucha, nudności, niestrawność i biegunkę. Objawy te występują częściej jeśli cynk przyjmowany jest na pusty żołądek. Objawy ustępują szybko po zaprzestaniu stosowania leku.

Długotrwałe stosowanie tabletek Zinkorot może powodować zmniejszenie wchłaniania miedzi, więc zaleca się kontrolowanie stężenia tego pierwiastka we krwi. Stosowanie leku przez dłuższy czas może także ograniczać wchłanianie żelaza.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty

Lek Zinkorot może wchodzić w interakcje z:

- środkami chelatującymi, np. D-penicylamina, kwas dimerkaptopropanosiarkowy (DMPS), kwas dimerkaptobursztynowy (DMSA) czy kwas etylenodiaminotetraoctowy (EDTA),
- solami żelaza, miedzi, wapnia,
- tetracyklinami, ofloksacyną i innymi chinolonami.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

- **Ciąża:** Leku Zinkorot nie należy stosować w okresie ciąży, chyba, że lekarz zaleci inaczej.
- **Karmienie piersią:** Nie zaleca się stosowania tego leku u kobiet karmiących piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat a także jeśli nie potrafią one połykać tabletek.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem:

- Pokarmy z dużą zawartością fityny (np. produkty zbożowe, warzywa, orzechy) zmniejszają wchłanianie cynku.
- Kawa może również hamować wchłanianie cynku.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG Calwer Str. 7 71034 Boblingen

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

