

Ziołowa Tradycja, Syrop Prawoślazowy 35,9 g/100 g, 125g



Cena: 6,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Substancja czynna	Althaea officinalis
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Ziołowa Tradycja, Syrop Prawoślazowy 35,9 g/100 g, 125g

(Althaeae radices maceratio)

Opis:

- Tradycyjny produkt leczniczy roślinny przeznaczony do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających wyłącznie z długiego okresu stosowania.

Skład:

- **Substancje czynne:** macerat z korzenia prawoślazu (*Althaea officinalis radix*)
- **100 g syropu zawiera** 35,9 g maceratu z korzenia prawoślazu (*Althaea officinalis L., radix*), (co odpowiada 5 g korzenia prawoślazu); ekstrahent: mieszanina wody i etanolu (47:1), kwas benzoesowy.
- Zawartość etanolu (760g/l) w produkcie wynosi nie więcej niż 1,1% (m/v).

- **Substancje pomocnicze o znanym działaniu:** sacharoza, kwas benzoesowy (E 210).

Produkt leczniczy zawiera 4,2 g sacharozy i 6,55 mg kwasu benzoesowego w 5 ml syropu.

Wskazania:

- Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany w celu łagodzenia podrażnień błony śluzowej górnych dróg oddechowych z towarzyszącym suchym kaszlem.

Przeciwwskazania:

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- **Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat** – trzy razy na dobę po 15 ml.
- **Dzieci w wieku 6-12 lat** – zazwyczaj cztery razy na dobę po 5 ml.
- **Dzieci w wieku 3-6 lat** – zazwyczaj cztery razy na dobę po 2,5 ml.
- **Dzieci w wieku poniżej 3 lat** – nie zaleca się stosowania

Jeśli objawy chorobowe utrzymują się dłużej niż tydzień, podczas stosowania produktu leczniczego, należy skontaktować się z lekarzem.

Sposób podawania

- Podanie doustne.
- Do opakowania dołączona jest miarka

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Działania niepożądane nie są znane.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy skonsultować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

- Jeśli dolegliwości nasilą się lub nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem.
- W razie wystąpienia duszności, gorączki lub ropnej plwociny należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

- Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego u dzieci w wieku poniżej 3 lat bez konsultacji z lekarzem.
- Syrop prawoślazowy Ziółowa Tradycja może opóźniać wchłanianie niektórych leków, dlatego zaleca się zachowanie 1 do 1 godziny odstępu podczas przyjmowania innych produktów leczniczych.

Ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych

- Produkt leczniczy zawiera 6,55 mg kwasu benzoesowego w 5 ml syropu.
- Ze względu na zawartość kwasu benzoesowego nie stosować u pacjentów z astmą oskrzelową.
- Produkt leczniczy zawiera 4,2 g sacharozy w 5 ml syropu. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.
- Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.
- Produkt zawiera 1,1% m/v etanolu (alkohol) tzn. do 186 mg na dawkę 15 ml, co jest równoważne 4,7 ml piwa, 2 ml wina na dawkę. Ze względu na zawartość alkoholu nie zaleca się podawania pacjentom z chorobami wątroby, padaczką oraz chorobą alkoholową.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

- Nie przeprowadzono badań odnośnie wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

- Nie zaleca się stosowania produktu w okresie ciąży ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania oraz ze względu na zawartość alkoholu.

Karmienie piersią

- Nie zaleca się stosowania produktu w okresie karmienia piersią ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania oraz ze względu na zawartość alkoholu.

Płodność

- Brak danych dotyczących wpływu na płodność.

Stosowanie innych leków:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

- Brak doniesień.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Podmiot odpowiedzialny:

"PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A., 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.