

Ziołowa Tradycja, Syrop Tymiankowy Złożony (0,945 g + 0,63 mg)/5 ml, syrop, 125g



Cena: 9,60 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Substancja czynna	Thymus vulgaris
Typ produktu	Lek ziołowy

Opis produktu

Lek bez recepty

Ziołowa Tradycja, Syrop Tymiankowy Złożony (0,945 g + 0,63 mg)/5 ml, syrop, 125g

(Sirupus thymi compositus)

Skład:

- **Substancje czynne:** wyciąg tymiankowy płynny (Thymi extractum fluidum DER 1:3) - 15,0 g, tymol (Thymolum) - 0,01 g.
- **Substancje pomocnicze:** amonowy wodorotlenek 10%, etanol 96% (v/v), syrop prosty.
- 100 g syropu sporządzonego wg receptury FP zawiera: wyciąg tymiankowy płynny (Thymi extractum fluidum DER 1:3) - 15,0 g, tymol (Thymolum) - 0,01 g.

Wskazania:

- Kaszel z trudnością w odkrztuszaniu lepkiej wydzieliny, tzw. kaszel mokry

Działanie:

- Wykrztuśne.

Przeciwwskazania:

- Uczulenie na substancje czynne, rośliny z rodziny jasnokatych (wargowych) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Sposób i droga podania

Podanie doustne. Do opakowania dołączona jest miarka.

O ile lekarz nie zaleci inaczej:

- **Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:** 10 ml syropu 3 razy na dobę.
- **Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:** 5 ml syropu 3 razy na dobę.

W trakcie leczenia należy przyjmować zwiększoną ilość płynów.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Mogą wystąpić dolegliwości żołądkowe (częstość nie jest znana).
- W bardzo rzadkich przypadkach obserwowano reakcje nadwrażliwości.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na opakowaniu, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

- Jeśli podczas stosowania syropu objawy nasilą się, utrzymują się dłużej niż 7 dni, lub jeśli pojawi się duszność, gorączka lub ropna plwocina należy skontaktować się z lekarzem.
- Jednorazowa dawka syropu dla dorosłych (10 ml) zawiera 7,2 g sacharozy. Jednorazowa dawka syropu dla dzieci (5 ml) zawiera 3,6 g sacharozy. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.
- W przypadku wcześniejszego stwierdzenia nietolerancji niektórych cukrów, przed przyjęciem leku należy skontaktować się z lekarzem.

- Syrop zawiera 7,9 % (v/v) etanolu (alkohol), tzn. do 0,6 g etanolu na dawkę, co jest równoważne 15,8 ml piwa i 6,6 ml wina na maksymalną dawkę jednorazową. Zachować ostrożność podczas stosowania u pacjentów z chorobą wątroby lub z padaczką. Lek może być szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

- Lek nie ma istotnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn. Ze względu na niewielką zawartość alkoholu, stosowanie leku może mieć wpływ na wynik urządzeń kontrolujących poziom alkoholu w powietrzu wydychanym.

Ciążą i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

- Bezpieczeństwo w czasie ciąży i laktacji nie zostało określone. Ze względu na brak wystarczających danych, nie zaleca się stosowania w okresie ciąży i laktacji.

Stosowanie innych leków:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

- Brak danych

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze poniżej 25°C.
- Chronić od światła

Podmiot odpowiedzialny:

“PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A., 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.