

## Zovirax Intensive, krem na opryszczkę, 2g



Cena: 24,56 PLN

### Opis słownikowy

Producent /  
Marka GlaxoSmithKline

Substancja  
czynna Aciclovirum

Typ produktu

### Opis produktu

## Lek bez recepty

### Zovirax Intensive, 50mg/g, krem - 2g

(Aciclovirum)

### Opis produktu:

Lek Zovirax Intensive w postaci kremu do stosowania na skórę zawiera substancję czynną acyklowir o działaniu przeciwwirusowym, wykazującą silne działanie na wirusa opryszczki pospolitej (Herpes simplex).

### Skład:

- Substancją czynną leku acyklowir

1 g kremu zawiera 50 mg acyklowiru

- Pozostałe składniki: glikol propylenowy, wazelina biała, alkohol cetostearylowy, parafina ciekła, Arlacel 165, poloksamer 407, sodu laurylosiarczan, dimetykon, woda oczyszczona.

## Wskazania:

- Lek Zovirax Intensive krem jest wskazany w miejscowym leczeniu nawrotowej opryszczki warg i twarzy, wywołanej przez wirusa opryszczki pospolitej Herpes simplex.

## Działanie:

- Działanie przeciwwirusowe, wykazujący silne działanie na wirusa opryszczki pospolitej (Herpes Simplex).

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek Zovirax Intensive w postaci kremu jest przeznaczony do stosowania na skórę.
- Zwykle, o ile lekarz nie zaleci inaczej, lek stosuje się jak opisano poniżej.
- Lek należy nakładać 5 razy na dobę na chorobowo zmienione miejsca na skórze w odstępach około czterogodzinnych, z przerwą nocną. Lek działa najskuteczniej, jeśli leczenie rozpoczyna się jak najszybciej po pojawieniu się pierwszych objawów opryszczki, jak np. pieczenie, swędzenie lub zaczerwienienie. Leczenie można również rozpocząć w późniejszym okresie choroby, gdy wystąpią grudki lub pęcherzyki.
- Leczenie należy prowadzić co najmniej przez 4 dni. Jeżeli nie nastąpiło zagojenie zmian skórnych, leczenie można przedłużyć do 10 dni. Jeśli zmiany chorobowe nie ustąpią po 10 dniach stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem.
- Aby zapobiec nasileniu się lub przeniesieniu zakażenia, należy umyć ręce przed nałożeniem i po nałożeniu leku, a także unikać niepotrzebnego pocierania zmian chorobowych lub dotykania ich rękami.

## Przeciwwskazania:

- Nie należy stosować leku jeśli pacjent ma uczulenie na acyklowir, walacyklowir, glikol propylenowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać stosowanie tego leku i skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia:

- Reakcji alergicznej o objawach obejmujących obrzęk twarzy.

**Niezbyt często ( u jednego na 100 pacjentów):**

- Łagodne wysuszenie lub złuszczenie skóry
- Przemijające uczucie pieczenia, kłucia lub mrowienia może pojawić się bezpośrednio po nałożeniu kremu - swędzenie

**Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów)**

- Rumień - kontaktowe zapalenie skóry po zastosowaniu leku Zovirax Intensive.

**Bardzo rzadko** (moga wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów)

- Nagłe reakcje nadwrażliwości, w tym ciężkie, jak obrzęk naczynioworuchowy i pokrzywka.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą

- Lek Zovirax Intensive zawiera glikol propylenowy oraz alkohol cetostearylowy.
- Ze względu na zawartość substancji pomocniczej glikolu propylenowego, lek może powodować podrażnienie skóry.
- Ze względu na zawartość substancji pomocniczej alkoholu cetostearylowego, lek może powodować miejscową reakcję skórą (np. kontaktowe zapalen

### Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

- Interakcje leku **Zovirax Intensive** z innymi lekami nie są znane.

## Przechowywanie:

- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Nie zamrażać
- Chronić od światła i wilgoci.
- Nie stosować po upływie terminu ważności.

## Podmiot odpowiedzialny:

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE, W. Rzymowskiego 53, Warszawa

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym