

Zoxin-med 20 mg/ml 100 ml



Cena: 26,60 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Aflofarm
Substancja czynna	Ketoconazolum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Zoxin-med, 20 mg/ml szampon leczniczy przeciwłupieżowy - 100 ml

(Ketoconazolum)

Opis produktu:

Szampon leczniczy przeciwłupieżowy zwalczający nie tylko objawy, ale także przyczynę łupieżu

Składniki:

- Substancja czynna - ketokonazol
- Substancje pomocnicze - sodu lauryloeterosiarczan, betaina kokosowa, dietanoloamid kwasów oleju kokosowego, glikozydy kwasów oleju kokosowego i oleinian glicerolu, all-rac- α -tokoferol, polisorbat 20, imidomocznik, czerwień koszenilowa (E 124), kompozycja zapachowa 60910, sodu chlorek, kwas solny, woda oczyszczona

Wskazania:

stosuje się w profilaktyce i miejscowym leczeniu zakażeń grzybiczych skóry, wywołanych przez drożdżaki z rodzaju *Malassezia*. Wywołują one przeróżne problemy skórne, na przykład:

- łupież skóry głowy (złuszczenie się naskórka w postaci białych, łatwo oddzielających się łusek)
- łojotokowe zapalenie skóry (brązowo-czerwone plamy na klatce piersiowej i na twarzy, które złuszczone są w postaci białych lub żółtych łusek)
- łupież pstry (małe, różowo-beżowe lub białe plamki)

Działanie:

- jest to lek o działaniu przeciwgrzybiczym, przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W łupieżu skóry głowy i łojotokowym zapaleniu skóry:

- leczniczo: 2 razy w tygodniu przez 2 do 4 tygodni, profilaktycznie: raz na 2 tygodnie

W łupieżu pстрыm:

- leczniczo: raz na dobę przez 5 dni, profilaktycznie: przed okresem letnim raz na dobę przez kolejne 3 dni

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000):

- świąd, pieczenie, kontaktowe zapalenie skóry, podrażnienie
- przetłuszczenie lub przesuszenie włosów

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000):

- zmiana koloru włosów, przede wszystkim uszkodzenie i siwienie włosów

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku Zoxin-med należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą

- gdy pacjent był leczony długotrwale miejscowo kortykosteroidami, w celu uniknięcia nasilenia objawów choroby po zaprzestaniu

ich stosowania, lekarz zaleci stopniowe (w ciągu 2 do 3 tygodni) wycofywanie leczenia kortykosteroidami. Na zbyt szybkie odstawienie kortykosteroidów skóra może zareagować zaczerwienieniem i swędzeniem. Lek można stosować dopiero po upływie 2 tygodni od zakończenia miejscowego leczenia kortykosteroidami

- jeżeli wystąpi reakcja nadwrażliwości objawiająca się m.in. zaczerwienieniem oraz swędzeniem skóry w miejscu kontaktu z szamponem, należy zaprzestać stosowania leku i porozumieć się z lekarzem
- unikać kontaktu leku z oczami
- gdy lek dostanie się do oczu, należy przemyć je dużą ilością wody
- przy łojotokowym zapaleniu skóry i łupieżu często występuje zwiększone wypadanie włosów, podczas stosowania leku Zoxin-med może się ono nasilić

Ciąża i karmienie piersią:

- jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku
- Zoxin-med można stosować w okresie ciąży i karmienia piersią tylko, gdy w opinii lekarza jest to zdecydowanie konieczne

Zoxin-med zawiera czerwień koszenilową (E 124)

- czerwień koszenilowa może powodować reakcje alergiczne

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
- Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą.

Podmiot odpowiedzialny:

Afłofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.