

# Zyrtec UCB, 10 mg, lek przeciwalergiczny, katar, pokrzywka, 10 tabletek



Cena: 15,99 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Vedim
Substancja czynna	Cetirizinum
Typ produktu	

## Opis produktu

## Lek bez recepty

## Zyrtec UCB 10 mg tabletki powlekane 10 sztuk

## (Cetirizinum)

## Opis produktu:

Zyrtec UCB to lek przeciwalergiczny, który zawiera cetyryzynę. Lek stosuje się w celu łagodzenia objawów sezonowego i przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa a także pokrzywki. Zyrtec UCB można podawać dzieciom w wieku od 6 lat oraz osobom dorosłym.

## Skład:

- **Substancja czynna** - cetyryzyny dichlorowodorek (Cetirizini dihydrochloridum).
- **Substancje pomocnicze** - celuloza mikrokryształiczna, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, Opadry Y-1-7000 (hypromeloza (E 464), tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400).

1 tabletką powlekana zawiera 10 mg cetyryzyny dichlorowodoru.

## Wskazania:

Lek Zyrtec UCB jest wskazany u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych:

- w łagodzeniu objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa,
- w łagodzeniu objawów pokrzywki.

## Działanie:

- Zyrtec UCB działa przeciwalergicznie (przeciwhistaminowo).

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zyrtec UCB stosuje się doustnie, popijając szklanką płynu.

**Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:** 10 mg (1 tabletkę) raz dziennie.

**Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:** 5 mg (pół tabletki powlekanej) dwa razy na dobę.

- Tabletkę powlekaną można podzielić na 2 równe dawki.
- Czas trwania leczenia zależy jak długo utrzymują się objawy. Bez konsultacji z lekarzem lek można stosować nie dłużej niż 10 dni.

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku Zyrtec UCB:

- jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek (ciężka niewydolność nerek z klirensiem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min),
- jeśli pacjent ma uczulenie na cetyryzyny dichlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, na hydroksyzynę lub pochodne piperazyny

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

**Często występujące działania niepożądane (1 na 10 pacjentów):**

- senność, zawroty głowy, bóle głowy,
- zapalenie gardła,
- zapalenie błony śluzowej nosa (u dzieci),
- biegunka, nudności,
- suchość w jamie ustnej,
- zmęczenie.

**Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób):**

- pobudzenie,
- parestezja (zaburzenia czucia),
- ból brzucha,
- świąd, wysypka,
- astenia (skrajne zmęczenie), złe samopoczucie.

**Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):**

- reakcje alergiczne, czasami ciężkie (bardzo rzadko),
- depresja, omamy, zachowanie agresywne, dezorientacja, bezsenność,
- drgawki,

- tachykardia (przyspieszone bicie serca),
- nieprawidłowa czynność wątroby,
- pokrzywka, obrzęk, zwiększenie masy ciała

**Bardzo rzadko występujące działania niepożądane** (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- trombocytopenia (mała liczba płytek krwi),
- tiki (skurcze nawykowe), dyskineza (ruchy mimowolne), dystonia (nieprawidłowe, długotrwałe skurcze mięśni), drżenie,
- omdlenie,
- zaburzenia smaku,
- niewyraźne widzenie, zaburzenia akomodacji (zaburzenia ostrości widzenia), rotacja gałek ocznych (niekontrolowane, koliste ruchy gałek ocznych),
- obrzęk naczynioruchowy (ciężka reakcja alergiczna powodująca obrzęk twarzy lub gardła), wysypka pętlek,
- zaburzenia oddawania moczu (moczenie nocne, ból i (lub) trudności w oddawaniu moczu)

**Częstość nieznaną:**

- zwiększony apetyt,
- próby samobójcze (nawracające myśli samobójcze lub zainteresowanie samobójstwem), koszmary senne,
- utrata pamięci, zaburzenia pamięci,
- zawroty głowy (uczucie wirowania lub utraty równowagi),
- zatrzymanie moczu (niemożność całkowitego opróżnienia pęcherza moczowego),
- świąd (intensywne swędzenie) i (lub) pokrzywka po przerwaniu stosowania leku,
- ból stawów,
- wysypka z pęcherzami zawierającymi wydzielinę ropną, zapalenie wątroby.

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjent cierpi na niewydolność nerek, problemy z oddawaniem moczu, choruje na padaczkę lub występuje ryzyko pojawienia się drgawek.
- **Zyrtec UCB** zawiera laktozę, więc jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

### Ciąża i karmienie piersią

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.
- Leku **Zyrtec UCB** nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

### Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Nie należy podawać tego leku dzieciom w wieku poniżej 6 lat, ponieważ lek w postaci tabletek nie pozwala na odpowiednie dostosowanie dawkowania.

### Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

- Nie wykazano, że **Zyrtec UCB** ogranicza zdolność do prowadzenia lub obsługi maszyn, ale jeśli pacjent zacznie odczuwać senność lub znaczne obniżenie koncentracji to nie powinien wykonywać tych czynności. Nie należy stosować większej niż zalecana dawki leku.

### Wpływ na badania laboratoryjne:

- Jeśli pacjent ma zaplanowane wykonanie testów alergicznych, należy zapytać lekarza, czy pacjent powinien przerwać

stosowanie leku na kilka dni przed badaniem. **Zyrtec UCB** może wpływać na wyniki testów alergicznych.

#### Stosowanie leku z jedzeniem i piciem:

- Pokarm nie wpływa na wchłanianie leku **Zyrtec UCB**.
- Tak jak w przypadku innych leków o działaniu przeciwhistaminowym, zaleca się unikać przyjmowania jednocześnie **Zyrtec UCB** z alkoholem.

#### Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Nie przechowywać w temperaturze do 25°C

#### Podmiot odpowiedzialny:

Vedim Sp. z o.o., Kruczkowskiego, Warszawa

#### Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.